

# Über das dielektrische Verhalten von Ampholyten.

---

## Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Philosophischen Fakultät

der

Philipps-Universität zu Marburg

vorgelegt von

**Erwin Horn**

aus Harburg (Elbe)



Marburg 1928

Als Dissertation angenommen am 13. Dezember 1927.

Berichterstatter: Prof. Dr. A. Thiel.

Tag der mündlichen Prüfung: 14. Dezember 1927.

Gedruckt mit Genehmigung der Fakultät.



Meinen lieben Eltern  
in Dankbarkeit gewidmet.

## Inhaltsverzeichnis.




|                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| I. Sachlage und Problemstellung . . . . .        | 5     |
| II. Beschreibung der Apparatur . . . . .         | 12    |
| a) Der Sendekreis . . . . .                      | 14    |
| b) Der Resonanz- und der Detektorkreis . . . . . | 16    |
| III. Ergebnisse der Messungen . . . . .          | 17    |
| IV. Besprechung der Meßresultate . . . . .       | 39    |
| V. Theoretische Folgerungen . . . . .            | 41    |
| VI. Zusammenfassung . . . . .                    | 43    |




## I. Sachlage und Problemstellung.

Substanzen, die gleichzeitig als Säure und Base fungieren können, werden als amphotere Elektrolyte bezeichnet. Während das amphotere Verhalten gewisser Metallhydroxyde auf einen und denselben Komplex zurückzuführen ist, beruht die Ampholytnatur organischer Verbindungen auf dem gleichzeitigen Vorhandensein einer sauren und einer basischen Gruppe in derselben Molekel. Der letztgenannte Typus, vertreten durch die Aminosäuren, besitzt insofern besonderes Interesse, als in seinen Lösungen Zwitterionen, d. h. Molekeln, die gleichzeitig eine positive und eine negative Ladung tragen, vorhanden sind. Auf die Existenz dieser Zwitterionen kann man aus dem chemischen und physikalisch-chemischen Verhalten der Aminosäuren schließen.

Für die  $\alpha$ -Amino-karbonsäuren hat schon Erlenmeyer<sup>1</sup> eine Ringformel angenommen, da sich in ihren Molekeln an zwei benachbarten C-Atomen eine  $\text{—COOH—}$  und  $\text{—NH}_2\text{—}$  Gruppe befinden, und deshalb die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines Aminsalzes besteht. Die Erlenmeyer'sche Konstitutionsformel



stellt ein „inneres Salz“ dar. In wässriger Lösung ist nun dieses „innere Salz“ wie jedes Salz dissoziiert. Infolge der gleichzeitigen Dissoziation der sauren und basischen Gruppe entstehen nun Ionen von der Form




die nach Küster<sup>2</sup> als Zwitterionen bezeichnet werden.

1) E. Erlenmeyer u. O. Sigel, A. 176, 349 (1875).

2) F. W. Küster, Z. f. anorg. Ch. 13, 136 (1897).

Aus dem Verhalten der aliphatischen Aminosäuren gegen Senföle schließen auch Marckwald und Mitarbeiter<sup>1</sup> auf eine ringförmige Konstitution. Während sich primäre Amine leicht und glatt mit Senfölen umsetzen, ist dies bei den Aminosäuren nicht der Fall. Erst in alkalischer Lösung setzt die Reaktion ein. Dieses Verhalten der Aminosäuren zeigt ganz klar, daß sie in wässriger Lösung keine freie  $\text{—NH}_2\text{—}$  Gruppe enthalten. Marckwald schließt deshalb auf eine Ringformel, die identisch ist mit der Zwitterionform. Aus dem Zwitterion bildet sich in alkalischer Lösung das Anion



mit freier  $\text{—NH}_2\text{—}$  Gruppe, das dann mit dem Senföl reagieren kann.

Ebenso wie gegen Senföle verhalten sich die Aminosäuren auch gegen Formaldehyd.<sup>2</sup>

Dieselben Verhältnisse liegen auch bei der Acetylierung der Sulfanilsäure vor. Wie Nietzki und Benckiser<sup>3</sup> festgestellt haben, gelingt die Acetylierung des Na-Salzes der Sulfanilsäure leicht durch Essigsäureanhydrid, während sich die freie Säure nicht in die Acetylverbindung überführen läßt. Das ist ein Zeichen dafür, daß in der Sulfanilsäure die  $\text{—NH}_2\text{—}$  Gruppe nicht intakt ist.

Aus konstitutiven Widersprüchen bei den Betaïnen der aromatischen Aminosäuren folgert auch Pfeiffer<sup>4</sup> die Zwitterionennatur dieser Verbindungen. Die Betaïne ordnen sich nicht in die Reihe der sonst gültigen Gesetze der Ringschließung ein. p- und m- Brücken, die sonst nicht im Benzolkern auftreten, sind bei den Betaïnen vorhanden. Die Annahme von Zwitterionen hebt alle Widersprüche auf. Gleichzeitig wird man so auch der bekannten Salznatur dieser Verbindungen gerecht. Pfeiffer<sup>5</sup> hat seine Ansicht

1) W. Marckwald, M. Neumark u. R. Stelzner. B. 24, 3279 (1891).

2) S. P. L. Sörensen, Biochem. Z. 7, 43 (1907).

3) R. Nietzki u. Th. Benckiser, B. 17, 707 (1884).

4) P. Pfeiffer, B. 55, 1762 (1922).

5) P. Pfeiffer u. G. Häfelin, B. 55, 1769 (1922).



Aus der entsprechenden Dissoziationsgleichung für die Amino-  
gruppe  $\text{NH}_2 \cdot \text{R} \cdot \text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} = +\text{NH}_3 \cdot \text{R} \cdot \text{COO}^- + \text{OH}^-$   
folgt für die Basendissoziationskonstante  $K_B$

$$4) K_B = \frac{[\text{A}^+ -] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}.$$

Da dem  $[\text{A}]$  hier  $[\text{A}^+ -]$  entspricht, kann man aus den alten  
 $k_a$ - und  $k_b$ -Werten  $K_S$  und  $K_B$  berechnen, indem man für

$$[\text{A}^+ -] \text{ in (3) bzw. (4) den Wert für } [\text{A}] \text{ aus (2): } [\text{A}] = \frac{[\text{A}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{k_b}$$

bzw. (1):  $[\text{A}] = \frac{[\text{A}^-] \cdot [\text{H}^+]}{k_a}$  einsetzt und für  $[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$  die  
Konstante  $K_{\text{H}_2\text{O}}$  einführt. Man erhält dann

$$5) K_S = \frac{K_{\text{H}_2\text{O}}}{k_b} \quad \text{und} \quad 6) K_B = \frac{K_{\text{H}_2\text{O}}}{k_a}.$$

$K_S$  ist also identisch mit der Hydrolysenkonstante, die der  
alten Basenkonstante  $k_b$  entspricht, und  $K_B$  stellt die  
Hydrolysenkonstante für die alte Säurekonstante  $k_a$  da. Für die  
 $K_S$ - und  $K_B$ -Werte erhält man nun im Gegensatz zu den  
 $k_a$ - und  $k_b$ -Werten sehr plausible Größen, die in guter Überein-  
stimmung mit den Strukturformeln stehen. Der Schluß ist  
also berechtigt, daß die Aminosäuren hauptsächlich als  
Zwitterionen in Lösung vorhanden sind. Nur bei den  
Aminobenzoesäuren, die verständliche  $k_a$ - und  $k_b$ -Werte als  
auch  $K_S$ - und  $K_B$ -Werte aufweisen, müssen wir annehmen,  
daß sowohl undissoziierte Molekeln als auch Zwitterionen in  
vergleichbaren Mengen in Lösung vorhanden sind.

Die für  $k_a$ ,  $k_b$ ,  $K_S$  und  $K_B$  gefundenen Gleichungen  
können wir noch etwas anders formulieren, wenn wir das  
gleichzeitige Vorhandensein von undissoziierten Molekeln und  
Zwitterionen annehmen. Wir erhalten dann

$$7) k'_a = \frac{[\text{A}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{A} + \text{A}^+ -]}$$

$$8) k'_b = \frac{[\text{A}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A} + \text{A}^+ -]}$$

$$9) K'_S = \frac{[\text{A} + \text{A}^+ -] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{A}^+]}$$

$$10) K'_B = \frac{[\text{A} + \text{A}^+ -] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}.$$

Lösen wir die rechte Seite der Gleichungen (9) und  
(10) in zwei Summanden auf, so ergibt sich folgendes:

$$11) K'_S = \frac{[A^{+-}] \cdot [H^+]}{[A^+]} + \frac{[A] \cdot [H^+]}{[A^+]} = K_S + \frac{K_{H_2O}}{k_b}$$

$$12) K'_B = \frac{[A^{+-}] \cdot [OH^-]}{[A^-]} + \frac{[A] \cdot [OH^-]}{[A^-]} = K_B + \frac{K_{H_2O}}{k_a}$$

$K'_S$  stellt also die Summe einer Dissoziationskonstante der Säure  $+NH_3 \cdot R \cdot COOH$  und einer Hydrolysenkonstante der Salze des Amins  $NH_2 \cdot R \cdot COOH$  dar, und  $K'_B$  setzt sich aus der Dissoziationskonstante des Amins  $NH_2 \cdot R \cdot COO^-$  und der Hydrolysenkonstante der Salze der Säure  $+NH_3 \cdot R \cdot COOH$  zusammen. Bei den Aminosäuren der aliphatischen Reihe sind  $K'_S$  und  $K'_B$  die reinen Säure- und Basenkonstanten, da hier die Hydrolysenkonstante zu vernachlässigen ist. Liegt der umgekehrte Fall vor, wie z. B. bei den Aminophenolen, braucht also die Dissoziationskonstante gegenüber der Hydrolysenkonstante nicht berücksichtigt zu werden, so resultiert  $K'_S$  bzw.  $K'_B$  als reine Hydrolysenkonstante der  $NH_2$ - bzw. Phenolgruppe. Wenn schließlich die Werte für die Dissoziations- und Hydrolysenkonstante in derselben Größenordnung liegen, wie z. B. bei den aromatischen Aminosäuren, so ist es nicht möglich, aus  $K'_S$  und  $K'_B$  die saure Natur der  $-COOH$ -Gruppe und die basische der  $-NH_2$ -Gruppe gesondert herauszulesen.

Bjerrum hat nun noch gezeigt, wie man auf rechnerischem und auf experimentellem Wege das Verhältnis  $\frac{[A^{+-}]}{[A]}$  bestimmen kann. Der erstere Weg hat zu dem Ergebnis geführt, daß die aliphatischen Aminosäuren in wässriger Lösung zu mehr als 99,5 % als Zwitterionen vorhanden sind. Bei den aromatischen Aminokarbonsäuren können die Zwitterionen in Mengen zwischen 10 % und 90 % anwesend sein. Die Aminobenzolsulfosäuren sind fast ausschließlich in der Zwitterionform vorhanden.

Von den experimentellen Wegen will ich nur kurz den der Löslichkeitsbeeinflussung durch Neutralsalzzusatz erwähnen. Die Aktivität der Zwitterionen wird nämlich durch Zusatz von Neutralsalz verringert, analog wie bei Salzen ohne gemeinschaftliche Ionen, und die Löslichkeit deshalb erhöht. Während Bjerrum dies an einigen Beispielen bestätigt

konnte, kommen andere Forscher (Pfeiffer,<sup>1</sup> v. Euler<sup>2</sup> u. a.) zu teilweise entgegengesetzten experimentellen Ergebnissen. Eine eindeutige Beziehung zwischen Löslichkeitsbeeinflussung und Zwitterionennatur ist nicht zu erkennen; denn Neutralsalze wirken bald löslichkeitserhöhend bald im umgekehrten Sinne, ohne Rücksicht auf Größe und Bau der Molekeln.

Um die Konstitution der Aminosäuren aufzuklären, haben Ley<sup>3</sup> und seine Schüler mit Erfolg den spektroskopischen Weg eingeschlagen. Während bei einer großen Reihe untersuchter aliphatischer und aromatischer Karbonsäuren die Salzbildung mit einem hypsochromatischen Effekt verbunden ist, tritt bei Aminosäuren ein bathochromatischer Effekt auf. Das ist leicht erklärlich. Wir brauchen uns nur klarzumachen, wie sich undissoziierte Molekel  $\text{NH}_2 \cdot \text{R} \cdot \text{COOH}$  (I), Zwitterion  $^+\text{NH}_3 \cdot \text{R} \cdot \text{COO}^-$  (II), Anion  $\text{NH}_2 \cdot \text{R} \cdot \text{COO}^-$  (III) und Kation  $^+\text{NH}_3 \cdot \text{R} \cdot \text{COOH}$  (IV) optisch verhalten werden. Die Absorption von I und II wird sehr verschieden sein, da in II die  $\text{NH}_2$ -Gruppe durch Salzbildung ausgeschaltet ist. II wird ähnlich absorbieren wie die Stammsäure  $\text{R} \cdot \text{COOH}$  bzw. ihr Jon  $\text{R} \cdot \text{COO}^-$ ; ebenso wird sich IV verhalten. Die Absorption von III ist gegenüber I etwas nach kurzen Wellen verschoben. Sind also in einer Lösung vorwiegend Zwitterionen vorhanden, so wird die Absorption durch Salzbildung, infolge der optischen Auswirkung der  $\text{NH}_2$ -Gruppe, eine bedeutende Verschiebung nach langen Wellen erfahren; überwiegen die undissoziierten Molekeln, so muß bei der Salzbildung die Absorption wie bei den nichtamidierten Karbonsäuren nach kurzen Wellen verschoben werden. Dies ist von Ley und Mitarbeitern experimentell bestätigt worden. Von den aliphatischen Aminosäuren wurde die Piperido-essigsäure untersucht, da sie noch gerade im äußersten ultravioletten Spektralgebiet absorbiert. Der zu erwartende bathochromatische Effekt bei der Salzbildung

1) P. Pfeiffer u. J. Würgler, Z. f. physiol. Ch. **97**, 125 (1916); P. Pfeiffer, Z. f. angew. Ch. **36**, 138 (1923).

2) H. v. Euler u. K. Rudberg, Z. f. anorg. Ch. **145**, 58 (1925).

3) H. Ley u. F. H. Zschacke, B. **57**, 1700 (1924); H. Ley u. H. Hünecke, B. **59**, 510 (1926); H. Hünecke, B. **60**, 1451 (1927).

wurde einwandfrei festgestellt. Die ziemlich genaue Ueber-einstimmung der Absorptionskurven für Piperido-essigsäure und für Na-acetat zeigt ganz deutlich, daß in der Piperido-essigsäure die Gruppe  $C_5H_{10}N$ — ihre optische Wirkung nicht hat entfalten können, und daß sie deshalb auch gar nicht als solche vorliegt. Erst in alkalischer Lösung kann sie sich optisch auswirken. Der optische Befund spricht also dafür, daß in der wässerigen Lösung der Piperido-essigsäure die Zwitterionen vorherrschen. Ohne Bedenken kann man dieses Ergebnis auch auf die anderen Amino-säuren der Fettreihe übertragen.

Ley und Hünecke haben ihre Untersuchungen auch noch auf die aromatischen Aminosäuren ausgedehnt. Benz-betaïn (Trimethyl-amino-benzoesäure), das nur in der Zwitter-ionform vorkommen kann, zeigt fast die gleiche Absorption wie die Benzoesäure. Die o-Dimethyl-amido-benzoesäure er-leidet beim Uebergang in das Na-Salz eine starke Verschie-bung der Absorption nach dem roten Spektralgebiet. Beide Beispiele sprechen für das Vorhandensein von Zwitterionen. Sehr interessant ist das optische Verhalten der o-Amino-benzoesäure und ihres Na-Salzes. In diesem Falle tritt näm-lich bei der Salzbildung eine Verschiebung nach kürzeren Wellen ein. Es entspricht dies dem Verhalten der aroma-tischen Karbonsäuren. In der wässerigen Lösung der Aminobenzoesäure sind also vorwiegend undissoziierte Mo-lekeln vorhanden. Dieses Ergebnis stellt eine glänzende Be-stätigung der Bjerrum'schen Anschauungen da.

Auf eine ganz andere Art und Weise hat Blüh<sup>1</sup> die Existenz der Zwitterionen zu beweisen versucht. Er faßt sie als Dipole mit großem elektrischen Moment auf und er-wartet von ihnen, daß sie in einer Lösung die Dielektrizitäts-konstante<sup>2</sup> des Lösungsmittels erhöhen. Messungen der DK wässriger Lösungen von Sulfanilsäure, o- und p-Amino-benzoesäure und Hippursäure ergaben auch Erhöhungen der DK über den Wasserwert. Auch Helianthin soll das-selbe Resultat zeigen. Es war aber nicht das Helianthin,

---

1) O. Blüh, Z. f. phys. Ch. 106, 341 (1923).

2) Im folgenden abgekürzt durch DK oder  $\epsilon$ .

die p-Dimethyl-amido-azobenzol-p'-sulfosäure, sondern, wie Thiel und Daßler<sup>1</sup> nachgewiesen haben, das Methylorange, das entsprechende Na-Salz, das Blüh gemessen hatte. Bei Methylorange kann man nun die Erhöhungen der DK nicht gut auf die Zwitterionen zurückführen, da in der wässrigen Lösung kaum Zwitterionen vorhanden sind. Für Methylorange sollte man eigentlich Erniedrigungen der DK erwarten, wie sie sonst bei Salzen gefunden worden sind.

Dieses merkwürdige Verhalten von Methylorange gab mit den Anstoß zu vorliegender Arbeit. In der Hauptsache handelte es sich um die Frage, ob der von Blüh entwickelte Gedankengang, daß die Zwitterionen ein großes Dipolmoment besitzen und ihre Lösungen deshalb Erhöhungen der DK des Lösungsmittels ergeben, richtig ist, und inwieweit man überhaupt aus dem dielektrischen Verhalten einer Lösung irgendwelche Schlüsse auf das Dipolmoment der gelösten Substanz ziehen kann.

---

## II. Beschreibung der Apparatur.

Blüh hat seine Messungen nach der bekannten zweiten Drudeschen Methode vorgenommen. Im Prinzip kann man nach dieser Methode Substanzen beliebig hoher Leitfähigkeit untersuchen. Die Einstellung auf Resonanz wird aber mit zunehmender Absorption so unsicher, daß man nichts Bestimmtes mehr über die DK aussagen kann. Aus diesem Grunde sind auch die nach dieser Methode ausgeführten DK-Messungen starker Elektrolyte voller Widersprüche. Nach einigen orientierenden Versuchen gab ich die Drudesche Methode infolge ungenügender Genauigkeit auf und machte mich an die Ausarbeitung einer Resonanzmethode, die an Stelle gedämpfter ungedämpfte Schwingungen verwendet, da sich diese bei Verwendung von Elektronenröhren mit völliger Konstanz der Frequenz erzeugen lassen. Das Prinzip der Methode ist folgendes. Lasse ich die von einem Sender ausgestrahlten hochfrequen-

---

1) A. Thiel u. A. Daßler, Z. f. phys. Ch. 108, 298 (1923).

ten Schwingungen auf einen aus Kapazität und Selbstinduktion bestehenden Schwingungskreis einwirken, so kann ich durch Verändern der Kapazität des letztgenannten Kreises, der Resonanzkreis heißen möge, diesen auf den Sender abstimmen, d. h. auf Resonanz einstellen. Schalte ich nun parallel zu dem Kondensator des Resonanzkreises noch einen Kondensator, den ich mit Flüssigkeiten bekannter DK fülle, so erhalte ich im Resonanzfalle jedes Mal eine bestimmte Stellung des ersten Kondensators. Trage ich dann die Kondensatorablesungen in Abhängigkeit von der DK der verwandten Flüssigkeiten in einem Koordinatensystem auf, so erhalte ich die Eichkurve des Kondensators. Beschicke ich nun den Flüssigkeitskondensator mit irgend einer Flüssigkeit unbekannter DK, so brauche ich nur auf Resonanz einzustellen und nachzusehen, welcher DK-Wert der Eichkurve der abgelesenen Kondensatorstellung entspricht.

Als ich noch mit Vorarbeiten beschäftigt war, erschien eine Arbeit von Walden, Ulich und Werner,<sup>1</sup> die nach demselben Prinzip eine Methode zur Bestimmung der DK von Elektrolytlösungen ausgearbeitet haben. Die Erfahrungen, die in dieser Arbeit hinsichtlich der Apparatur niedergelegt sind, konnte ich mir deshalb zu Nutze machen. Eine große Reihe von Schwierigkeiten war aber trotzdem noch zu überwinden.

Fig. 1 gibt ein rein schematisches Bild der Apparatur. S stellt den Sendekreis, der induktiv mit dem Resonanzkreise R gekoppelt ist, dar. F ist der Flüssigkeits- und M der Meßkondensator. Mit R ist der Detektorkeis D induktiv gekoppelt. V bedeutet ein Vakuumthermoelement und G ein Galvanometer.




Fig. 1.

<sup>1</sup>) P. Walden, H. Ulich u. O. Werner, Z. f. phys. Ch. **115**, 177 (1925).

### a) Der Sendekreis.

Da man durch Erhöhen der Frequenz den ungünstigen Einfluß der Leitfähigkeit bis zu einem gewissen Grade unterdrücken kann, ist es vorteilhaft, mit möglichst kurzen Wellen zu arbeiten. Nach einer von Eccles und Jordan<sup>1</sup> angegebenen Gegentaktschaltung habe ich einen Sender gebaut, der Schwingungen von der Wellenlänge  $\lambda = 5$  m erzeugt. Fig. 2 gibt die Schaltungsskizze wieder.




Fig. 2.

Zur Erzeugung der Schwingungen wurden zwei Röhren, Type R. S. 55/I der Telefunken A.-G., verwendet. Sie werden so in den Schwingungskreis eingeschaltet, daß ihre Eigenkapazitäten zwischen Gitter und Anode in Serie geschaltet sind, und somit die Gesamtkapazität des Schwingungskreises gleich der halben Kapazität einer Röhre ist. Die Selbstinduktion besteht aus einer Kupferdrahtspule (a) von zwei Windungen von 11 cm  $\Phi$ , die zwischen den beiden Anoden (A) liegt. Gemäß der Thomsonschen Formel 
$$\nu = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$
 sind für hohe Frequenzen ( $\nu$ ) nur sehr kleine Werte von Kapazität (C) und Selbstinduktion (L) erforderlich.

1) Eccles u. Jordan, Electrician 83, 299 (1919).

Induktiv gekoppelt ist mit a die Kupferdrahtspule b von zwei Windungen von 5 cm  $\varnothing$ , deren Enden zu den Gittern (G) der beiden Röhren führen. Der Wicklungssinn der Spule b ist entgegengesetzt der von a. Die Anodenspannung  $E_a$  wird in der Mitte der Spule a zugeführt. Die Mitte der Spule b ist über einen Silitwiderstand von 1000 Ohm mit den Kathoden (K) verbunden. Durch die symmetrische Leitungsführung wird erreicht, daß weder in der Zuführung zum Anodenkreis noch in der zum Gitterkreis Hochfrequenzströme fließen, da in der Mitte beider Spulen Knoten der Wechselspannung liegen. Die Zuführungsdrähte sind deshalb nicht von störendem Einfluß auf die Abstimmung der Kreise.

Die Konstanz der erzeugten Wellen hängt sehr stark von der genauen Innehaltung der Heizstromstärke und der Anodenspannung ab. Als Heizbatterie wurde eine 12 Volt-Batterie von über 100 Amp.-Std. Kapazität benutzt. Der Heizstrom betrug 4,6 A. Wie aus Fig. 2 ersichtlich, waren die beiden Kathoden parallel geschaltet. Für die Anodenspannung waren 440 V erforderlich. Zuerst wurde die Spannung zwischen den beiden Außenleitern der städtischen Leitung benutzt. Störungen und Schwankungen im Ortsnetz führten mich aber nach einiger Zeit zur Verwendung einer Hochspannungsbatterie von 440 V. Der negative Pol dieser Batterie, die, wie überhaupt die ganze Apparatur, bestens isoliert aufgestellt war, wurde geerdet. Nicht eingezeichnet sind in Fig. 2 je ein Voltmeter für Heiz- und Anodenspannung und je ein dünnes Nickeldrättchen vor den Eintrittsstellen der Anodenspannung in die Apparatur zur Sicherung gegen etwaigen Kurzschluß. Das Milli-ampere-meter Ja zeigte den Emissionsstrom an. Er betrug 6 mA.

Die Wellenlänge des Senders wurde mittels eines induktiv gekoppelten Lecherschen Paralleldrahtsystems gemessen. Ein auf die Drahtleitung gehängtes 4 V-Lämpchen leuchtet an den Spannungsbäuchen hell auf. Der Abstand zwischen zwei Stellen hellen Aufleuchtens beträgt  $\frac{\lambda}{2}$ . Der Sender wurde auf die Welle  $\lambda = 5$  m eingestellt.

### b) Der Resonanz- und der Detektorkreis.

Der Resonanzkreis war induktiv mit dem Sender gekoppelt. Über der Anodenspule des Senders befand sich in einem Abstände von 19 cm eine aus vier Windungen von 11 cm  $\varnothing$  bestehende Spule, deren beide Enden in ein 1,35 m langes Paralleldrahtsystem ausliefen und zu den beiden parallel geschalteten Kondensatoren führten. Der Meßkondensator entsprach dem von Walden<sup>1</sup> usw. verwandten. Zwischen zwei feststehenden Kondensatorplatten von  $2 \times 1,5$  cm, die sich in einigen mm Entfernung gegenüberstehen, befindet sich ein verschiebbares Glasplättchen von 0,8 mm Dicke, das in ein T-förmiges Messingstück eingekittet ist. Dieses gleitet in einer entsprechenden Aussparung eines Hartgummiblocks. Eine Schraubenspindel von 1 mm Ganghöhe bewegt das Messingstück und damit das Glasplättchen vorwärts. Sie trägt eine in 100 Teile (1 Teilstrich =  $\frac{1}{100}$  mm) geteilte Trommel. Die ganzen Umdrehungen werden an einem Millimetermaßstabe abgelesen. Zur Ausschaltung der kapazitiven Einflüsse des Experimentierenden wurde der Kondensator mit Hilfe einer Stange aus einer Entfernung von 2 m bedient. Auch der von Walden<sup>2</sup> usw. benutzte Flüssigkeitskondensator diente mir als Vorbild (s. Fig. 3).



Fig. 3.

Die Einschmelzstellen der beiden Platindrähte liegen über dem Flüssigkeitsspiegel. Die Platindrähte sind genügend weit von der Glaswand entfernt, um das Klettern der Flüssigkeit auf ein Minimum herabzudrücken. Der Flüssigkeitskondensator ist tunlichst oft mit Chromsäure zu reinigen, um mit einer möglichst gleichartigen Benetzung und damit gleichen Flüssigkeitshöhe rechnen zu können.

Zur Temperaturkontrolle wurde noch ein Thermometer eingeschliffen. Die Menge der jeweils eingefüllten Flüssigkeit betrug 7,5 ccm. Sie wurde mittels einer Pipette eingebracht. Die Messungen wurden bei  $20^{\circ} \pm 0,1^{\circ}$  ausgeführt. Die Temperaturkonstanz wurde durch Konstanthalten der Zimmertemperatur erzielt.

1) loc. cit. S. 186.

2) Z. f. phys. Ch. **116**, 275 (1925), Fig. 9.

Schließlich wäre noch der Detektorkreis zu besprechen. Wie aus der schematischen Fig. 1 ersichtlich, war der eine der Paralleldrähte des Resonanzkreises an einer Stelle ringförmig gestaltet. Induktiv, in einem festen Abstände von 3 cm, war damit ein gleicher Draht ring gekoppelt, dessen Enden zu einem Vakuumthermoelement und dann über eine verdrehte Leitung zu einem empfindlichen Spiegelgalvanometer führten. Das Thermoelement ist ein birnenförmiges, evakuiertes Glasgefäß, in das ein Thermokreuz aus Eisen-Konstantan eingeschmolzen ist. Die aufgenommenen Schwingungen erzeugen in ihm einen Thermostrom, der von dem Galvanometer angezeigt wird. Im Resonanzfalle zeigt das Galvanometer einen maximalen Ausschlag an. Zur Ablesung des Galvanometers wurde die sehr genaue Kollimatorablesung benutzt. Im Galvanometerkreis lag noch ein regulierbarer Widerstand.

Mit der beschriebenen Apparatur läßt sich bis zur Leitfähigkeit  $\sim 10^{-4} \text{ Ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$  eine Genauigkeit der DK-Messungen von 1–2‰ erzielen.

### III. Ergebnisse der Messungen.

Zunächst mußte der Meßkondensator mit Flüssigkeiten bekannter DK geeicht werden. Da ich die DK wässriger Lösungen bestimmen wollte, kamen nur solche Eichflüssigkeiten in Frage, deren DK in der Nähe des Wasserwertes lag. Es wurden deshalb Wasser<sup>1</sup> und Aceton-<sup>2</sup> Wassergemische benutzt. Der DK-Wert für Wasser beträgt für  $t = 20^\circ$  80,50.<sup>3</sup> Die DK von Aceton-Wassergemischen ist von Drude<sup>4</sup> bestimmt worden. Aus der von ihm gefundenen Kurve, die die Abhängigkeit der DK des Gemisches von den Gewichtsprozenten Aceton des Gemisches wiedergibt, habe ich folgende drei Werte entnommen (Tabelle 1):

1) aqua destillata.

2) Aceton aus der Bisulfitverbindung (Kahlbaum).

3) P. Walden, H. Ulich u. O. Werner, Z. f. phys. Ch. **116**, 261 (1925).

4) P. Drude, Z. f. phys. Ch. **23**, 314 (1897).

Tabelle 1.

|       | p   | $\epsilon$ 19° | $\epsilon$ 20° |
|-------|-----|----------------|----------------|
| E I   | 20% | 70,00          | 69,65          |
| E II  | 15% | 73,00          | 72,635         |
| E III | 10% | 76,00          | 75,62          |

E I, E II und E III bezeichnen die drei verschiedenen Gemische, p bedeutet Gewichtsprocente Aceton,  $\epsilon$  19° bzw.  $\epsilon$  20° sind die DK-Werte für  $t = 19^\circ$  bzw.  $t = 20^\circ$ . Die Werte für  $\epsilon$  20° können aus  $\epsilon$  19° berechnet werden, da die prozentische Abnahme von  $\epsilon$  19° mit steigender Temperatur bekannt ist. Nach Drude<sup>1</sup> beträgt  $\Delta\epsilon = -0,5\%$  für ein Grad Temperaturzuwachs.

Der Gang der Messungen gestaltete sich folgendermaßen. Nach Einschaltung des Senders wurde der tadellos mit Chromsäure gereinigte und getrocknete Flüssigkeitskondensator mittels einer Pipette mit 7,5 ccm der zu messenden Flüssigkeit gefüllt und das Thermometer eingesetzt. Dann wurde die Kapazität des Meßkondensators durch langsames Einschieben des Glasplättchens so lange vergrößert, bis der gleichzeitig beobachtete Galvanometeraus Schlag ein Maximum erreicht hatte. Dieser maximale Ausschlag ist ein Zeichen dafür, daß der Resonanzpunkt erreicht ist. Vergrößert man die Kapazität des Meßkondensators noch weiter, so erfolgt eine Verminderung des Ausschlages. Man stellt also auf Resonanz ein, indem man den „Umkehrpunkt“ der vor dem Fadenkreuz vorbeiwandernden Skala beobachtet und die Stellung des Meßkondensators beim „Umkehrpunkt“ abliest. Die eben beschriebene Auffindung des Resonanzpunktes wurde bei jeder gemessenen Flüssigkeit ungefähr sechsmal ausgeführt und der Mittelwert aus den einzelnen Ablesungen genommen. Zur Kontrolle der Resultate wurde jede Lösung nacheinander in zwei gleichgebauten Flüssigkeitskondensatoren gemessen. Die Verwendung zweier Flüssigkeitskondensatoren hat noch einen anderen Vorteil. Steht nur ein Kondensator zur Verfügung, so muß man nach jeder Messung mit dem Einfüllen einer neuen Lösung geraume Zeit warten,

1) *ibid.* S. 288.

bis der gereinigte und getrocknete Kondensator wieder Zimmertemperatur angenommen hat. Bei der Benutzung von zwei Kondensatoren kann man ohne Pause messen, da in der Zeit, in der der eine Kondensator zur Messung gebraucht wird, der andere sich auf konstante Temperatur einstellen kann.

Es folgen nun zunächst die Messungen mit den Eichflüssigkeiten.

Tabelle 2.

| Flüssigkeitskondensator I  |       |        |       |                  |                     |
|----------------------------|-------|--------|-------|------------------|---------------------|
| Eichflüssigkeit :          | E I   | E II   | E III | H <sub>2</sub> O | E III *)<br>t = 19° |
| $\epsilon :$               | 69,65 | 72,635 | 75,62 | 80,50            | 76,00               |
| Kondensator-<br>stellung k | 1816  | 1483   | 1150  | 608              | 1116                |
|                            | 1818  | 1485   | 1153  | 609              | 1109                |
|                            | 1822  | 1476   | 1154  | 611              | 1107                |
|                            | 1819  | 1480   | 1152  | 612              | 1111                |
|                            | 1818  | 1479   | 1149  | 607              | 1117                |
|                            | 1821  | 1477   | 1152  | 613              | 1113                |
| Mittelwert                 | 1819  | 1480   | 1152  | 610              | 1112                |

Aenderung von  
 $\epsilon$  pro Skalenteil

0,0089      0,0091      0,0090      0,00896

\*) alle anderen Messungen stets bei 20°.


Tabelle 3.

| Flüssigkeitskondensator II |       |        |       |                  |
|----------------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Eichflüssigkeit :          | E I   | E II   | E III | H <sub>2</sub> O |
| $\epsilon :$               | 69,65 | 72,635 | 75,62 | 80,50            |
| Kondensator-<br>stellung k | 1762  | 1449   | 1205  | 716              |
|                            | 1761  | 1452   | 1207  | 714              |
|                            | 1757  | 1458   | 1204  | 719              |
|                            | 1758  | 1456   | 1205  | 718              |
|                            | 1760  | 1457   | 1206  | 719              |
|                            | 1757  | 1453   | 1209  | 715              |
| Mittelwert                 | 1759  | 1454   | 1206  | 717              |

Aenderung von  
 $\epsilon$  pro Skalenteil

0,0098      0,012      0,010

Trägt man nun die Abhängigkeit der DK von der Kondensatorstellung in einem Koordinatensystem auf, so erhält man die Eichkurven des Meßkondensators, die sich auf die Benutzung des Flüssigkeitskondensators I bzw. II beziehen. Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, verlaufen die Kurven ziemlich genau linear. Vor der Messung irgendeiner Lösung unbekannter DK muß die Eichkurve erst kontrolliert werden, da durch Anziehen von Schrauben u. a. kleinere oder größere Kapazitätsänderungen eintreten, die eine Verschiebung der Eichkurve zur Folge haben. Da die Eichkurven linear verlaufen, genügt es, zwei Punkte der Kurven nachzumessen. Den Wert für  $\varepsilon$  einer gemessenen Lösung kann man entweder aus der Eichkurve entnehmen oder rechnerisch ermitteln, indem man die Differenz der Kondensatorstellungen einer Eichflüssigkeit und der Lösung mit der Änderung von  $\varepsilon$  pro Skalenteil multipliziert und den so erhaltenen Wert von der DK der Eichflüssigkeit abzieht oder ihn zuzählt, entsprechend der Lage der beiden Kondensatorstellungen.



Zur Prüfung meiner Apparatur habe ich eine von Walden, Ulich und Werner<sup>1</sup> untersuchte KCl-Lösung und eine von Fürth<sup>2</sup> gemessene Glykokoll-Lösung nachgemessen. (Siehe die Tabelle 4).

Aus meinen Messungen ergibt sich für die KCl-Lösung die DK zu 79,26, während Walden usw. 79,20 gefunden haben. Für die 0,94%ige Glykokoll-Lösung finde ich  $\varepsilon = 85,30$ , während Fürth nach der Drudeschen Methode für die 1%ige Lösung  $\varepsilon = 85,4$  erhalten hat. Die Resultate stehen also in guter Übereinstimmung miteinander.

1) P. Walden, H. Ulich und O. Werner, Z. f. phys. Ch. **116**, 261 (1925).

2) R. Fürth, Ann. d. Phys. **70**, 63 (1923).

Tabelle 4.

|                                                             | Flüssigkeitskondensator I |       |                  | Flüssigkeitskondensator I                                   |       |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Flüssigkeit:                                                | H <sub>2</sub> O          | E III | K Cl<br>c=0,0008 | H <sub>2</sub> O                                            | E III | Glykokoll<br>0,94 % |
| ε:                                                          | 80,50                     | 75.62 | 79,26            | 80,50                                                       | 75,62 | 85,30               |
| Konden-<br>sator-<br>stellung                               | 630                       | 1174  | 774              | 632                                                         | 1172  | 99                  |
|                                                             | 635                       | 1176  | 769              | 627                                                         | 1170  | 102                 |
|                                                             | 631                       | 1177  | 765              | 626                                                         | 1166  | 97                  |
|                                                             | 634                       | 1179  | 775              | 629                                                         | 1168  | 95                  |
|                                                             | 636                       | 1178  | 769              | 631                                                         | 1170  | 98                  |
|                                                             |                           |       | 770              |                                                             |       | 96                  |
|                                                             |                           |       | 776              |                                                             |       | 100                 |
| Mittelwert                                                  | 633                       | 1177  | 771              | 629                                                         | 1169  | 98 *)               |
| $\Delta\varepsilon = \overbrace{0,00897}$<br>pro Skalenteil |                           |       |                  | $\Delta\varepsilon = \overbrace{0,00904}$<br>pro Skalenteil |       |                     |

\*) Diese Kondensatorstellung liegt außerhalb der Eichkurve, deren Verlauf aber auch hier wohl als geradlinig anzunehmen ist, sodaß eine mäßige Extrapolation von  $\varepsilon$  zulässig ist.

Im folgenden sind die DK-Messungen wässriger Lösungen verschiedener Konzentration von Methylorange, p- und o-Aminobenzoesäure,  $\alpha$ -Amino-iso-valeriansäure,  $\delta$ -Amino-n-valeriansäure und Glycylglycin in extenso wiedergegeben.

### Methylorange

(p-Dimethylamido-azobenzol-p'-sulfosaures Natrium).

Es wurde ein mehrmals umkristallisiertes Präparat (Kahlbaum) verwendet. In den Tabellen ist Methylorange-Lösung mit M abgekürzt. c bedeutet die Konzentration und zwar in Mol/l.

Tabelle 5.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                               | Flüssigkeitskondensator II |       |                               |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| Flüssigkeit:                  | H <sub>2</sub> O          | E III | M<br>c = 2 · 10 <sup>-3</sup> | H <sub>2</sub> O           | E III | M<br>c = 2 · 10 <sup>-3</sup> |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 79,75                         | 80,50                      | 75,62 | 79,81                         |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 683                       | 1225  | 770                           | 785                        | 1280  | 853                           |
|                               | 678                       | 1227  | 766                           | 787                        | 1273  | 842                           |
|                               | 681                       | 1226  | 761                           | 780                        | 1271  | 855                           |
|                               | 687                       | 1235  | 770                           | 779                        | 1274  | 852                           |
|                               | 676                       | 1238  | 763                           | 781                        | 1270  | 856                           |
|                               | 675                       | 1229  | 760                           | 786                        | 1276  | 854                           |
| Mittelwert                    | 680                       | 1230  | 765                           | 783                        | 1274  | 852                           |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil: 0,0887

0,010

Tabelle 6.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                                 |                                   | Flüssigkeitskondensator II |       |                                 |                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Flüssigkeit :                 | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{M}{c = 1 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{M}{c = 0,5 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{M}{c = 1 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{M}{c = 0,5 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon :$                  | 80,50                     | 75,62 | 79,96                           | 80,17                             | 80,50                      | 80,50 | 79,92                           | 80,21                             |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 678                       | 1223  | 739                             | 707                               | 778                        | 1274  | 829                             | 815                               |
|                               | 674                       | 1216  | 731                             | 711                               | 775                        | 1270  | 826                             | 810                               |
|                               | 675                       | 1226  | 737                             | 717                               | 779                        | 1268  | 833                             | 805                               |
|                               | 670                       | 1220  | 740                             | 712                               | 785                        | 1273  | 837                             | 811                               |
|                               | 679                       | 1225  | 733                             | 715                               | 784                        | 1266  | 835                             | 806                               |
|                               |                           | 1222  |                                 | 710                               |                            | 1264  | 838                             | 807                               |
| Mittelwert                    | 675                       | 1222  | 736                             | 712                               | 780                        | 1269  | 833                             | 809                               |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil : 0,0089

0,010

Tabelle 7.

|                                         | Flüssigkeitskondensator I |       |                                    |                                     | Flüssigkeitskondensator II |       |                                    |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Flüssig-<br>keit :                      | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{M}{c = 0,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{M}{c = 0,125 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{M}{c = 0,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{M}{c = 0,125 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon :$                            | 80,50                     | 75,62 | 80,42                              | 80,47                               | 80,50                      | 75,62 | 80,40                              | 80,47                               |
| Kon-<br>den-<br>sator-<br>stel-<br>lung | 636                       | 1190  | 649                                | 648                                 | 753                        | 1235  | 759                                | 758                                 |
|                                         | 640                       | 1186  | 656                                | 641                                 | 749                        | 1239  | 761                                | 752                                 |
|                                         | 639                       | 1188  | 653                                | 642                                 | 751                        | 1236  | 765                                | 754                                 |
|                                         | 643                       | 1182  | 645                                | 646                                 | 754                        | 1240  | 756                                | 751                                 |
|                                         | 645                       | 1185  | 649                                | 640                                 | 747                        | 1242  | 759                                | 755                                 |
|                                         | 643                       |       | 648                                | 647                                 | 746                        | 1239  | 760                                | 748                                 |
| Mittel-<br>wert                         | 641                       | 1186  | 650                                | 644                                 | 750                        | 1238  | 760                                | 753                                 |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil : 0,00895

0,010

In Tabelle 8 sind die einzelnen  $\epsilon$ -Werte zusammengestellt.

Tabelle 8.


| $\frac{M}{c \cdot 10^{-3}}$ | 2     | 1     | 0,5   | 0,25  | 0,125 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\epsilon$                  | 79,75 | 79,96 | 80,17 | 80,42 | 80,47 |
|                             | 79,81 | 79,92 | 80,21 | 80,40 | 80,47 |
| Mittel                      | 79,78 | 79,94 | 80,19 | 80,41 | 80,47 |

Tabelle 9.

| Gew. % M | $\epsilon$ (Blüh) | $\epsilon$ (Horn) |
|----------|-------------------|-------------------|
| 0,0015   | 87,0              | 80,47             |
| 0,003    | 89,4              |                   |
| 0,0041   |                   |                   |
| 0,0045   | 89,7              | 80,41             |
| 0,0075   | 87,2              |                   |
| 0,0082   |                   |                   |
| 0,0105   | 87,5              | 80,19             |
| 0,0150   | 88,0              |                   |
| 0,016    |                   |                   |
| 0,03     | 89,5              | 79,94             |
| 0,033    |                   |                   |
| 0,06     | 89,8              |                   |
| 0,066    |                   | 79,78             |
| 0,09     | 88,8              |                   |
| 0,15     | 86,4              |                   |

Tab. 9 gibt eine Gegenüberstellung der von Blüh und der von mir gefundenen  $\epsilon$ -Werte. Fig. 5 gibt die graph. Darstellung dieser Beziehungen.

Fig. 5.  
 $\epsilon$ -c-Kurve für Methylorange.



### p-Aminobenzoesäure.

Zur Verwendung gelangte ein Kahlbaum-Präparat „zur Analyse“. p-Aminobenzoesäure ist in den Tabellen durch p-A abgekürzt.

Tabelle 10.

| Flüssigkeit:                  | Flüssigkeitskondensator I |       |                             | Flüssigkeitskondensator II |       |                             |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | p-A<br>$c=10 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | p-A<br>$c=10 \cdot 10^{-3}$ |
| $\epsilon$ :                  | 80,50                     | 75,62 | 79,89                       | 80,50                      | 75,62 | 80,06                       |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 669                       | 1215  | 747                         | 773                        | 1271  | 828                         |
|                               | 665                       | 1222  | 739                         | 779                        | 1268  | 822                         |
|                               | 672                       | 1217  | 735                         | 777                        | 1264  | 815                         |
|                               | 676                       | 1220  | 741                         | 782                        | 1272  | 820                         |
|                               | 673                       | 1219  | 736                         | 780                        | 1266  | 825                         |
|                               |                           | 1215  | 742                         | 777                        |       |                             |
| Mittelwert                    | 671                       | 1218  | 740                         | 778                        | 1268  | 822                         |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil: 0,0089

0,010

Tabelle 11.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                                  | Flüssigkeitskondensator II |       |                                  |
|-------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------|
| Flüssig-<br>keit:             | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{p-A}{c=10 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{p-A}{c=10 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,03                            | 80,50                      | 75,62 | 79,94                            |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 679                       | 1223  | 735                              | 779                        | 1270  | 845                              |
|                               | 675                       | 1228  | 729                              | 783                        | 1268  | 840                              |
|                               | 674                       | 1222  | 731                              | 784                        | 1267  | 832                              |
|                               | 676                       | 1221  | 722                              | 778                        | 1271  | 834                              |
|                               | 673                       | 1226  | 728                              | 781                        | 1272  | 830                              |
|                               | 678                       | 1224  | 727                              |                            |       | 836                              |
|                               |                           |       | 730                              |                            |       | 842                              |
| Mittelwert                    | 676                       | 1224  | 729                              | 781                        | 1270  | 837                              |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil: 0,0089

0,010

Tabelle 12.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                                 |                                   | Flüssigkeitskondensator II |       |                                 |                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Flüssig-<br>keit:             | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{p-A}{c=5 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{p-A}{c=2,5 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{p-A}{c=5 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{p-A}{c=2,5 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,05                           | 80,13                             | 80,50                      | 75,82 | 80,11                           | 80,17                             |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 663                       | 1195  | 704                             | 703                               | 772                        | 1260  | 815                             | 802                               |
|                               | 659                       | 1198  | 708                             | 695                               | 775                        | 1262  | 809                             | 807                               |
|                               | 655                       | 1204  | 706                             | 699                               | 769                        | 1259  | 811                             | 799                               |
|                               | 657                       | 1202  | 715                             | 706                               | 767                        | 1257  | 806                             | 796                               |
|                               | 661                       | 1205  | 712                             | 696                               | 767                        | 1258  | 807                             | 803                               |
|                               |                           |       | 710                             | 701                               |                            |       | 810                             | 808                               |
|                               |                           |       |                                 | 700                               |                            |       | 805                             | 805                               |
| Mittel-<br>wert               | 659                       | 1201  | 709                             | 700                               | 770                        | 1259  | 809                             | 803                               |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil: 0,0090

0,010

Tabelle 13.

|                                         | Flüssigkeitskondensator I |       |                                    |                                 | Flüssigkeitskondensator II |       |                                    |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| Flüssig-<br>keit:                       | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{p-A}{c=1,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{p-A}{c=1 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{p-A}{c=1,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{p-A}{c=1 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\varepsilon$ :                         | 80,50                     | 75,62 | 80,19                              | 80,20                           | 80,50                      | 75,62 | 80,21                              | 80,22                           |
| Kon-<br>den-<br>sator-<br>stel-<br>lung | 655                       | 1129  | 686                                | 691                             | 766                        | 1259  | 805                                | 799                             |
|                                         | 653                       | 1197  | 680                                | 697                             | 771                        | 1260  | 800                                | 793                             |
|                                         | 657                       | 1198  | 688                                | 688                             | 765                        | 1254  | 794                                | 796                             |
|                                         | 656                       | 1195  | 693                                | 685                             | 768                        | 1255  | 798                                | 801                             |
|                                         | 654                       | 1199  | 695                                | 683                             | 767                        | 1257  | 792                                | 794                             |
|                                         |                           |       | 689                                | 685                             | 770                        |       | 794                                | 795                             |
|                                         |                           |       | 592                                | 689                             |                            |       |                                    | 793                             |
| Mittel-<br>wert                         | 655                       | 1196  | 689                                | 688                             | 768                        | 1257  | 797                                | 796                             |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil: 0,0090

0,010

Tabelle 14.

| Flüssig-<br>keit:                       | Flüssigkeitskondensator I |       |                                           |                                           | Flüssigkeitskondensator II |       |                                           |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{p-A}{c} \approx 0,5 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{p-A}{c} \approx 0,1 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{p-A}{c} \approx 0,5 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{p-A}{c} \approx 0,1 \cdot 10^{-3}$ |
| $\epsilon$ :                            | 80,50                     | 75,62 | 80,35                                     | 80,44                                     | 80,50                      | 75,62 | 80,31                                     | 80,46                                     |
| Kon-<br>den-<br>sator-<br>stel-<br>lung | 665                       | 1208  | 674                                       | 673                                       | 771                        | 1269  | 788                                       | 783                                       |
|                                         | 664                       | 1206  | 675                                       | 669                                       | 776                        | 1266  | 792                                       | 779                                       |
|                                         | 658                       | 1201  | 679                                       | 665                                       | 773                        | 1260  | 797                                       | 776                                       |
|                                         | 659                       | 1203  | 682                                       | 666                                       | 777                        | 1263  | 799                                       | 780                                       |
|                                         | 663                       | 1207  | 684                                       | 670                                       | 775                        | 1262  | 795                                       | 781                                       |
|                                         | 662                       |       | 681                                       | 671                                       | 778                        | 1265  | 793                                       | 775                                       |
| Mittel-<br>wert                         | 662                       | 1205  | 679                                       | 669                                       | 775                        | 1264  | 794                                       | 779                                       |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil: 0,0090


0,010

Tabelle 15 gibt eine Zusammenstellung der einzelnen  $\epsilon$ -Werte, Fig. 6 die zugehörige graphische Darstellung.

Tabelle 15.

| $\frac{p-A}{c} \cdot 10^{-3}$ | 0,1   | 0,5   | 1     | 1,25  | 2,5   | 5     | 10    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\epsilon$                    | 80,44 | 80,35 | 80,20 | 80,19 | 80,13 | 80,05 | 79,89 |
|                               |       |       |       |       |       |       | 80,06 |
|                               |       |       |       |       |       |       | 80,03 |
|                               | 80,46 | 80,31 | 80,22 | 80,21 | 80,17 | 80,11 | 79,94 |
| Mittelwert                    | 80,45 | 80,33 | 80,21 | 80,20 | 80,15 | 80,08 | 79,98 |

Fig. 6.  
 $\epsilon$ -c-Kurve der p-Aminobenzoesäure.



In Tabelle 16 sind die von Blüh und die von mir gefundenen  $\epsilon$ -Werte einander gegenübergestellt.

Tabelle 16.

| p-A<br>Gew. % | $\epsilon$ Blüh | $\epsilon$ Horn |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 0,0014        |                 | 80,45           |
| 0,0027        |                 | 80,33           |
| 0,014         |                 | 80,21           |
| 0,017         |                 | 80,20           |
| 0,023         | 81,7            |                 |
| 0,034         |                 | 80,15           |
| 0,047         | 84,5            |                 |
| 0,069         |                 | 80,08           |
| 0,095         | 87,5            |                 |
| 0,14          |                 | 79,98           |
| 0,19          | 88,5            |                 |
| 0,28          | 87,5            |                 |
| 0,38          | 86,0            |                 |

### o-Aminobenzoessäure.

Es wurde ein Kahlbaum-Präparat benutzt.

o-Aminobenzoessäure ist im folgenden durch o-A abgekürzt.

Tabelle 17.

|                          | Flüssigkeitskondensator I |       |                                    | Flüssigkeitskondensator II |       |                                    |
|--------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| Flüssigkeit :            | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{o-A}{c = 10 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{o-A}{c = 10 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon$ :             | 80,50                     | 75,62 | 79,98                              | 80,50                      | 75,62 | 80,11                              |
| Kondensator-<br>stellung | 669                       | 1210  | 725                                | 773                        | 1267  | 810                                |
|                          | 662                       | 1214  | 721                                | 778                        | 1266  | 815                                |
|                          | 663                       | 1209  | 718                                | 781                        | 1263  | 817                                |
|                          | 667                       | 1207  | 712                                | 776                        | 1265  | 820                                |
|                          | 668                       | 1209  | 717                                | 782                        | 1261  | 813                                |
|                          | 667                       | 1211  | 715                                | 779                        | 1268  | 821                                |
|                          |                           |       | 719                                |                            |       | 823                                |
| Mittelwert               | 666                       | 1210  | 718                                | 778                        | 1265  | 817                                |

$\Delta \epsilon$  pro Skalenteil : 0,0090

0,010

Tabelle 18.

|                          | Flüssigkeitskondensator I |       |                                    | Flüssigkeitskondensator II |       |                                    |
|--------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| Flüssigkeit :            | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{o-A}{c} = 10 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{o-A}{c} = 10 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon :$          | 80,50                     | 75,62 | 80,05                              | 80,50                      | 75,62 | 80,14                              |
| Kondensator-<br>stellung | 673                       | 1209  | 717                                | 779                        | 1268  | 819                                |
|                          | 671                       | 1211  | 715                                | 782                        | 1265  | 824                                |
|                          | 669                       | 1215  | 719                                | 780                        | 1266  | 818                                |
|                          | 670                       | 1212  | 725                                | 777                        | 1263  | 812                                |
|                          | 668                       | 1210  | 721                                | 778                        | 1267  | 814                                |
|                          | 669                       | 1214  | 724                                | 784                        |       | 810                                |
|                          |                           |       | 718                                |                            |       | 817                                |
| Mittelwert               | 670                       | 1212  | 720                                | 780                        | 1266  | 816                                |

$\Delta \varepsilon$  pro Skalenteil : 0,0090

0,010

Tabelle 19.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                                   |                                   | Flüssigkeitskondensator II |       |                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|
| Flüssig-<br>keit :            | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{o-A}{c} = 5 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{o-A}{c} = 5 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{o-A}{c} = 5 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon :$               | 80,50                     | 75,62 | 80,13                             | 80,10                             | 80,50                      | 75,62 | 80,15                             |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 678                       | 1221  | 707                               | 712                               | 786                        | 1269  | 811                               |
|                               | 675                       | 1224  | 715                               | 719                               | 784                        | 1268  | 817                               |
|                               | 675                       | 1222  | 721                               | 725                               | 782                        | 1271  | 822                               |
|                               | 673                       | 1225  | 718                               | 717                               | 781                        | 1270  | 816                               |
|                               | 674                       | 1222  | 720                               | 726                               | 783                        | 1272  | 820                               |
|                               |                           |       | 717                               | 719                               | 781                        |       | 824                               |
|                               |                           |       | 721                               | 722                               |                            |       | 817                               |
| Mittel-<br>wert               | 675                       | 1223  | 717                               | 720                               | 783                        | 1270  | 818                               |

$\Delta \varepsilon$  pro Skalenteil : 0,0089

0,010

Tabelle 20.

| Flüssigkeit:                  | Flüssigkeitskondensator I |       |                                     |                                      | Flüssigkeitskondensator II |       |                                     |                                      |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{o-A}{c = 2,5 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{o-A}{c = 1,25 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{o-A}{c = 2,5 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{o-A}{c = 1,25 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon$ :                  | 80,50                     | 75,62 | 80,17                               | 80,25                                | 80,50                      | 75,62 | 80,21                               | 80,23                                |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 675                       | 1219  | 709                                 | 699                                  | 782                        | 1269  | 803                                 | 807                                  |
|                               | 671                       | 1216  | 707                                 | 702                                  | 781                        | 1273  | 808                                 | 811                                  |
|                               | 668                       | 1220  | 713                                 | 697                                  | 780                        | 1270  | 813                                 | 809                                  |
|                               | 673                       | 1223  | 714                                 | 696                                  | 779                        | 1272  | 813                                 | 806                                  |
|                               | 674                       | 1222  | 708                                 | 700                                  | 780                        | 1271  | 806                                 | 802                                  |
|                               | 676                       | 1219  | 711                                 | 705                                  | 778                        |       | 811                                 | 804                                  |
|                               |                           |       | 709                                 | 707                                  |                            |       | 808                                 | 809                                  |
| Mittel-<br>wert               | 673                       | 1220  | 710                                 | 701                                  | 780                        | 1271  | 809                                 | 807                                  |

$\Delta \epsilon$  pro Skalenteil: 0,0089

0,0099

Tabelle 21.

| Flüssigkeit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |                                   | Flüssigkeitskondensator II |       |                                   |
|--------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|
|                          | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{o-A}{c = 1 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{o-A}{c = 1 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon$ :             | 80,50                     | 75,62 | 80,25                             | 80,50                      | 75,62 | 80,29                             |
| Kondensator-<br>stellung | 677                       | 1224  | 702                               | 784                        | 1277  | 804                               |
|                          | 675                       | 1227  | 705                               | 787                        | 1274  | 809                               |
|                          | 676                       | 1225  | 706                               | 783                        | 1274  | 805                               |
|                          | 674                       | 1226  | 703                               | 786                        | 1273  | 811                               |
|                          | 677                       | 1223  | 699                               | 785                        | 1276  | 807                               |
|                          |                           |       | 705                               |                            |       | 800                               |
|                          |                           |       | 707                               |                            |       | 805                               |
| Mittelwert               | 676                       | 1225  | 704                               | 785                        | 1275  | 806                               |

$\Delta \epsilon$  pro Skalenteil: 0,0089

0,00996

Tabelle 22.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                                        |                                        | Flüssigkeitskondensator II |       |                                        |                                        |
|-------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Flüssig-<br>keit:             | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{o-A}{c} \leq 0,5 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{o-A}{c} \leq 0,1 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{o-A}{c} \leq 0,5 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{o-A}{c} \leq 0,1 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,30                                  | 80,44                                  | 80,50                      | 75,62 | 80,34                                  | 80,42                                  |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 666                       | 1212  | 682                                    | 677                                    | 779                        | 1267  | 799                                    | 786                                    |
|                               | 664                       | 1214  | 688                                    | 672                                    | 780                        | 1265  | 795                                    | 783                                    |
|                               | 663                       | 1216  | 687                                    | 673                                    | 775                        | 1266  | 791                                    | 787                                    |
|                               | 668                       | 1215  | 691                                    | 669                                    | 776                        | 1263  | 788                                    | 785                                    |
|                               | 664                       | 1218  | 693                                    | 671                                    | 776                        | 1268  | 796                                    | 781                                    |
|                               |                           |       | 685                                    | 667                                    |                            |       | 790                                    | 786                                    |
|                               |                           |       | 690                                    | 675                                    |                            |       | 792                                    | 787                                    |
| Mittel-<br>wert               | 665                       | 1215  | 688                                    | 672                                    | 777                        | 1266  | 793                                    | 785                                    |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil: 0,00887

0,010

Tabelle 23.

Zusammenstellung der gefundenen  $\varepsilon$ -Werte.

| $\frac{o-A}{c} \cdot 10^{-3}$ | 0,1   | 0,5   | 1     | 1,25  | 2,5   | 5     | 10    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\varepsilon$                 | 80,44 | 80,30 | 80,25 | 80,25 | 80,17 | 80,13 | 79,98 |
|                               |       |       |       |       |       | 80,10 | 80,11 |
|                               |       |       |       |       |       |       | 80,05 |
|                               | 80,42 | 80,34 | 80,29 | 80,23 | 80,21 | 80,15 | 80,14 |
| Mittelwert                    | 80,43 | 80,32 | 80,27 | 80,24 | 80,19 | 80,13 | 80,07 |

Fig. 7.

$\varepsilon$ -c-Kurve der o-Aminobenzoesäure.




Tabelle 24.

Gegenüberstellung der von Blüh und der von mir gefundenen  $\epsilon$ -Werte.

| $\alpha$ -A<br>Gew. % | $\epsilon$ Blüh | $\epsilon$ Horn |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 0,0014                |                 | 80,43           |
| 0,0027                |                 | 80,32           |
| 0,014                 |                 | 80,27           |
| 0,017                 |                 | 80,24           |
| 0,034                 |                 | 80,19           |
| 0,069                 |                 | 80,13           |
| 0,085                 | 85,5            |                 |
| 0,14                  |                 | 80,07           |
| 0,17                  | 87,5            |                 |
| 0,35                  | 87,2            |                 |
| 0,51                  | 85              |                 |
| 0,69                  | 87              |                 |

### $\alpha$ -Amino-iso-valeriansäure.

Zur Verwendung kam ein Präparat von Kahlbaum.  
 $\alpha$ -A bedeutet in den Tabellen  $\alpha$ -Amino-iso-valeriansäure.

Tabelle 25.

| Flüssig-<br>keit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |        |                                                | Flüssigkeitskondensator II |        |                                                |                                                |
|-------------------------------|---------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | E II   | $\frac{\alpha\text{-A}}{c = 10 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E II   | $\frac{\alpha\text{-A}}{c = 10 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{\alpha\text{-A}}{c = 10 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon$ :                  | 80,50                     | 75,62 | 72,635 | 80,52                                          | 80,50                      | 72,635 | 80,54                                          | 80,56                                          |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 804                       | 1340  | 1667   | 802                                            | 918                        | 1648   | 909                                            | 912                                            |
|                               | 801                       | 1344  | 1669   | 799                                            | 915                        | 1651   | 914                                            | 905                                            |
|                               | 801                       | 1345  | 1672   | 797                                            | 915                        | 1653   | 910                                            | 909                                            |
|                               | 803                       | 1342  | 1670   | 801                                            | 913                        | 1647   | 913                                            | 910                                            |
|                               | 802                       | 1344  | 1671   | 803                                            | 914                        | 1651   | 904                                            | 907                                            |
|                               |                           |       |        | 800                                            |                            |        | 911                                            | 908                                            |
|                               |                           |       |        | 798                                            |                            |        | 916                                            | 911                                            |
| Mittel-<br>wert               | 802                       | 1343  | 1670   | 800                                            | 915                        | 1650   | 911                                            | 909                                            |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil:

0,0090 0,00913

0,0107

Tabelle 26.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                                        |                                          | Flüssigkeitskondensator II |        |                                        |                                          |
|-------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Flüssig-<br>keit:             | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\alpha-A}{c = 5 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{\alpha-A}{c = 2,5 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E II   | $\frac{\alpha-A}{c = 5 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{\alpha-A}{c = 2,5 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,49                                  | 80,48                                    | 80,50                      | 72,635 | 80,53                                  | 80,50                                    |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 812                       | 1353  | 813                                    | 809                                      | 925                        | 1659   | 917                                    | 926                                      |
|                               | 811                       | 1349  | 807                                    | 812                                      | 924                        | 1657   | 923                                    | 921                                      |
|                               | 809                       | 1350  | 806                                    | 806                                      | 920                        | 1662   | 920                                    | 921                                      |
|                               | 810                       | 1348  | 802                                    | 804                                      | 921                        | 1660   | 916                                    | 923                                      |
|                               | 808                       | 1351  | 812                                    | 809                                      | 920                        | 1661   | 915                                    | 919                                      |
|                               |                           |       | 809                                    | 811                                      |                            |        | 920                                    | 920                                      |
|                               |                           |       | 813                                    | 805                                      |                            |        | 922                                    | 923                                      |
| Mittel-<br>wert               | 810                       | 1350  | 809                                    | 808                                      | 922                        | 1660   | 919                                    | 922                                      |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil:  
0,00904

0,010

Tabelle 27.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                                           |                                        | Flüssigkeitskondensator II |        |                                           |                                        |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Flüssig-<br>keit:             | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\alpha-A}{c = 1,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{\alpha-A}{c = 1 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E II   | $\frac{\alpha-A}{c = 1,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{\alpha-A}{c = 1 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,41                                     | 80,39                                  | 80,50                      | 72,635 | 80,45                                     | 80,39                                  |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 806                       | 1344  | 813                                       | 816                                    | 923                        | 1659   | 929                                       | 931                                    |
|                               | 802                       | 1347  | 818                                       | 819                                    | 920                        | 1658   | 924                                       | 928                                    |
|                               | 807                       | 1350  | 814                                       | 822                                    | 917                        | 1661   | 923                                       | 927                                    |
|                               | 805                       | 1346  | 817                                       | 816                                    | 919                        | 1660   | 928                                       | 932                                    |
|                               | 809                       | 1347  | 820                                       | 817                                    | 921                        | 1663   | 923                                       | 929                                    |
|                               |                           |       | 816                                       | 820                                    |                            |        | 926                                       | 929                                    |
|                               |                           |       | 814                                       | 817                                    |                            |        | 922                                       | 933                                    |
| Mittel-<br>wert               | 806                       | 1347  | 816                                       | 818                                    | 920                        | 1660   | 925                                       | 930                                    |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil:  
0,0090

0,0106

Tabelle 28.

|                          | Flüssigkeitskondensator I |       |                                          | Flüssigkeitskondensator II |        |                                          |
|--------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------|
| Flüssigkeit :            | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\alpha-A}{c = 0,5 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E II   | $\frac{\alpha-A}{c = 0,5 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon :$             | 80,50                     | 75,62 | 80,25                                    | 80,50                      | 72,635 | 80,23                                    |
| Kondensator-<br>stellung | 814                       | 1351  | 835                                      | 926                        | 1667   | 958                                      |
|                          | 812                       | 1355  | 839                                      | 927                        | 1661   | 952                                      |
|                          | 808                       | 1350  | 838                                      | 928                        | 1666   | 946                                      |
|                          | 810                       | 1357  | 844                                      | 925                        | 1669   | 951                                      |
|                          | 810                       | 1353  | 840                                      | 930                        | 1667   | 954                                      |
|                          |                           |       | 837                                      |                            |        | 953                                      |
|                          |                           |       | 840                                      |                            |        | 956                                      |
| Mittelwert               | 811                       | 1353  | 839                                      | 927                        | 1666   | 953                                      |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil : 0,0090

0,0106

Tabelle 29.

|                              | Flüssigkeitskondensator I |       |                                           |                                            | Flüssigkeitskondensator II |        |                                           |                                            |
|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Flüssig-<br>keit :           | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\alpha-A}{c = 0,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{\alpha-A}{c = 0,125 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E II   | $\frac{\alpha-A}{c = 0,25 \cdot 10^{-3}}$ | $\frac{\alpha-A}{c = 0,125 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon :$                 | 80,50                     | 75,62 | 80,32                                     | 80,44                                      | 80,50                      | 72,635 | 80,34                                     | 80,46                                      |
| Konden-<br>sator<br>stellung | 806                       | 1349  | 826                                       | 809                                        | 921                        | 1659   | 934                                       | 927                                        |
|                              | 802                       | 1347  | 827                                       | 811                                        | 923                        | 1656   | 938                                       | 928                                        |
|                              | 808                       | 1350  | 822                                       | 814                                        | 918                        | 1661   | 938                                       | 925                                        |
|                              | 806                       | 1344  | 819                                       | 813                                        | 920                        | 1660   | 932                                       | 922                                        |
|                              | 803                       | 1351  | 826                                       | 809                                        | 923                        | 1656   | 936                                       | 921                                        |
|                              |                           |       | 829                                       | 811                                        |                            |        | 938                                       | 927                                        |
|                              |                           |       | 825                                       | 816                                        |                            |        |                                           | 926                                        |
| Mittel-<br>wert              | 805                       | 1348  | 825                                       | 812                                        | 921                        | 1658   | 936                                       | 925                                        |


$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil :  
0,0090

0,0107

Tabelle 30.  
Zusammenstellung der gemessenen  $\epsilon$ -Werte.

| $\frac{\alpha\text{-A}}{c \cdot 10^{-3}}$ | 0,125 | 0,25  | 0,5   | 1     | 1,25  | 2,5   | 5     | 10             |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| $\epsilon$                                | 80,44 | 80,32 | 80,25 | 80,39 | 80,41 | 80,48 | 80,49 | 80,52          |
|                                           | 80,46 | 80,34 | 80,23 | 80,39 | 80,45 | 80,50 | 80,53 | 80,54<br>80,56 |
| Mittelwert                                | 80,45 | 80,33 | 80,24 | 80,39 | 80,43 | 80,49 | 80,51 | 80,54          |

Figur 8.  
 $\epsilon$ -c-Kurve der  $\alpha$ -Amino-iso-valeriansäure



### $\delta$ -Amino-n-valeriansäure.

Es wurde ein Kahlbaum-Präparat verwendet.

$\delta$ -A bedeutet in den Tabellen  $\delta$ -Amino-n-valeriansäure.

Tabelle 31.

|                          | Flüssigkeitskondensator I |       |                                                | Flüssigkeitskondensator II |       |                                                |
|--------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------|
|                          | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\delta\text{-A}}{c = 10 \cdot 10^{-3}}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{\delta\text{-A}}{c = 10 \cdot 10^{-3}}$ |
| $\epsilon$ :             | 80,50                     | 75,62 | 80,83                                          | 80,50                      | 75,62 | 80,80                                          |
| Kondensator-<br>stellung | 802                       | 1349  | 773                                            | 919                        | 1415  | 892                                            |
|                          | 806                       | 1344  | 771                                            | 922                        | 1410  | 896                                            |
|                          | 806                       | 1341  | 765                                            | 926                        | 1412  | 895                                            |
|                          | 802                       | 1346  | 766                                            | 923                        | 1417  | 890                                            |
|                          | 809                       | 1345  | 766                                            | 920                        | 1411  | 888                                            |
|                          |                           |       | 769                                            |                            | —     | 892                                            |
| Mittelwert               | 805                       | 1345  | 768                                            | 922                        | 1413  | 892                                            |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil: 0,0090

0,00994

Tabelle 32.

| Flüssig-<br>keit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |                                                    |                                                   | Flüssigkeitskondensator II |       |                                                    |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\partial A}{\partial c} = 10 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{\partial A}{\partial c} = 5 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{\partial A}{\partial c} = 10 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{\partial A}{\partial c} = 5 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,77                                              | 80,72                                             | 80,50                      | 75,62 | 80,81                                              | 80,73                                             |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 807                       | 1354  | 779                                                | 785                                               | 927                        | 1419  | 897                                                | 901                                               |
|                               | 811                       | 1353  | 777                                                | 780                                               | 922                        | 1416  | 893                                                | 903                                               |
|                               | 813                       | 1349  | 780                                                | 784                                               | 925                        | 1413  | 899                                                | 909                                               |
|                               | 809                       | 1351  | 784                                                | 788                                               | 929                        | 1415  | 899                                                | 902                                               |
|                               | 809                       | 1352  | 779                                                | 788                                               | 926                        | 1418  | 892                                                | 904                                               |
|                               |                           |       | 782                                                | 790                                               |                            |       | 890                                                | 900                                               |
| Mittel-<br>wert               | 810                       | 1352  | 780                                                | 786                                               | 926                        | 1416  | 895                                                | 903                                               |

$\Delta \varepsilon$  pro Skalenteil: 0,0090

0,00996

Tabelle 33.

| Flüssig-<br>keit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |                                                     |                                                      | Flüssigkeitskondensator II |       |                                                     |                                                      |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\partial A}{\partial c} = 2,5 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{\partial A}{\partial c} = 1,25 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{\partial A}{\partial c} = 2,5 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{\partial A}{\partial c} = 1,25 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,57                                               | 80,41                                                | 80,50                      | 75,62 | 80,59                                               | 80,37                                                |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 810                       | 1356  | 802                                                 | 820                                                  | 929                        | 1420  | 917                                                 | 935                                                  |
|                               | 811                       | 1353  | 799                                                 | 827                                                  | 926                        | 1425  | 913                                                 | 939                                                  |
|                               | 811                       | 1350  | 805                                                 | 820                                                  | 923                        | 1418  | 918                                                 | 943                                                  |
|                               | 815                       | 1355  | 808                                                 | 817                                                  | 928                        | 1414  | 923                                                 | 941                                                  |
|                               | 812                       | 1351  | 803                                                 | 823                                                  | 928                        | 1415  | 921                                                 | 938                                                  |
|                               |                           |       | 806                                                 | 825                                                  |                            | 1417  | 916                                                 | 943                                                  |
| Mittel-<br>wert               | 812                       | 1353  | 804                                                 | 822                                                  | 927                        | 1418  | 918                                                 | 940                                                  |

$\Delta \varepsilon$  pro Skalenteil 0,0090:

0,00994

Tabelle 34.

| Flüssig-<br>keit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |                                                   |                                                     | Flüssigkeitskondensator II |       |                                                   |                                                     |
|-------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | $\frac{\partial A}{\partial c} = 1 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{\partial A}{\partial c} = 0,5 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\frac{\partial A}{\partial c} = 1 \cdot 10^{-3}$ | $\frac{\partial A}{\partial c} = 0,5 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,39                                             | 80,43                                               | 80,50                      | 75,62 | 80,41                                             | 80,47                                               |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 809                       | 1353  | 821                                               | 811                                                 | 923                        | 1406  | 932                                               | 921                                                 |
|                               | 806                       | 1350  | 823                                               | 816                                                 | 922                        | 1409  | 927                                               | 917                                                 |
|                               | 807                       | 1351  | 820                                               | 814                                                 | 917                        | 1410  | 924                                               | 922                                                 |
|                               | 804                       | 1347  | 817                                               | 810                                                 | 921                        | 1408  | 930                                               | 926                                                 |
|                               | 809                       | 1349  | 816                                               | 819                                                 | 918                        | 1411  | 933                                               | 925                                                 |
|                               |                           |       | 818                                               | 820                                                 |                            |       | 928                                               | 927                                                 |
| Mittel-<br>wert               | 807                       | 1350  | 819                                               | 815                                                 | 920                        | 1409  | 929                                               | 923                                                 |

$\Delta \varepsilon$  pro Skalenteil: 0,00899

0,00998

Tabelle 35.

|                     | Flüssigkeitskondensator I |       |                                         |                                          | Flüssigkeitskondensator II |       |                                         |                                          |
|---------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Flüssigkeit:        | H <sub>2</sub> O          | E III | $\delta$ -A<br>$c = 0,25 \cdot 10^{-3}$ | $\delta$ -A<br>$c = 0,125 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | $\delta$ -A<br>$c = 0,25 \cdot 10^{-3}$ | $\delta$ -A<br>$c = 0,125 \cdot 10^{-3}$ |
| $\epsilon$ :        | 80,50                     | 75,62 | 80,49                                   | 80,48                                    | 80,50                      | 75,62 | 80,47                                   | 80,50                                    |
| Kondensatorstellung | 800                       | 1348  | 806                                     | 808                                      | 919                        | 1408  | 923                                     | 914                                      |
|                     | 803                       | 1343  | 801                                     | 807                                      | 916                        | 1411  | 920                                     | 917                                      |
|                     | 806                       | 1346  | 798                                     | 800                                      | 917                        | 1406  | 920                                     | 915                                      |
|                     | 803                       | 1348  | 802                                     | 802                                      | 912                        | 1405  | 916                                     | 920                                      |
|                     | 798                       | 1350  | 803                                     | 805                                      | 916                        | 1406  | 915                                     | 916                                      |
|                     |                           |       | 809                                     | 803                                      |                            |       | 921                                     | 913                                      |
| Mittelwert          | 802                       | 1347  | 803                                     | 804                                      | 916                        | 1407  | 919                                     | 916                                      |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil: 0,00895

0,00994


Tabelle 36.

Zusammenstellung der gemessenen  $\epsilon$ -Werte.

| $\delta$ -A<br>$c \cdot 10^{-3}$ | 0,125 | 0,25  | 0,5   | 1     | 1,25  | 2,5   | 5      | 10    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| $\epsilon$                       | 80,48 | 80,49 | 80,43 | 80,39 | 80,41 | 80,57 | 80,72  | 80,77 |
|                                  |       |       |       |       |       |       |        | 80,81 |
|                                  | 80,50 | 80,47 | 80,47 | 80,41 | 80,37 | 80,59 | 80,73  | 80,83 |
|                                  |       |       |       |       |       |       |        | 80,80 |
| Mittelwert                       | 80,49 | 80,48 | 80,45 | 80,40 | 80,39 | 80,58 | 80,725 | 80,80 |

Fig. 9.

$\epsilon$ -c-Kurve der  $\delta$ -Amino-n-valeriansäure.



### Glycylglycin.

Das Präparat wurde nach der Vorschrift von E. Fischer<sup>1</sup> hergestellt.

Glycylglycin ist im folgenden durch Gl. abgekürzt.

Tabelle 37.

|                          | Flüssigkeitskondensator I |       |                               | Flüssigkeitskondensator II |       |                               |
|--------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| Flüssigkeit:             | H <sub>2</sub> O          | E III | Gl.<br>$c = 10 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | Gl.<br>$c = 10 \cdot 10^{-3}$ |
| $\epsilon$ :             | 80,50                     | 75,62 | 80,77                         | 80,50                      | 75,62 | 80,71                         |
| Kondensator-<br>stellung | 809                       | 1352  | 780                           | 924                        | 1415  | 888                           |
|                          | 811                       | 1354  | 777                           | 922                        | 1411  | 901                           |
|                          | 811                       | 1350  | 784                           | 920                        | 1410  | 905                           |
|                          | 807                       | 1350  | 785                           | 926                        | 1413  | 904                           |
|                          | 815                       | 1356  | 779                           | 923                        | 1414  | 889                           |
|                          | 813                       | 1357  | 780                           | 924                        | 1414  | 906                           |
| Mittelwert               | 811                       | 1353  | 781                           | 923                        | 1413  | 902                           |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil: 0,0090

0,0096

Tabelle 38.

|                               | Flüssigkeitskondensator I |       |                               |                              | Flüssigkeitskondensator II |       |                               |                              |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| Flüssig-<br>keit:             | H <sub>2</sub> O          | E III | Gl.<br>$c = 10 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 5 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | Gl.<br>$c = 10 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 5 \cdot 10^{-3}$ |
| $\epsilon$ :                  | 80,50                     | 75,62 | 80,72                         | 80,65                        | 80,50                      | 75,62 | 80,76                         | 80,63                        |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 821                       | 1358  | 792                           | 805                          | 935                        | 1421  | 911                           | 915                          |
|                               | 820                       | 1355  | 796                           | 803                          | 933                        | 1418  | 906                           | 924                          |
|                               | 816                       | 1360  | 799                           | 798                          | 930                        | 1422  | 908                           | 918                          |
|                               | 819                       | 1363  | 797                           | 804                          | 930                        | 1419  | 908                           | 917                          |
|                               | 818                       | 1361  | 801                           | 800                          | 934                        | 1420  | 904                           | 922                          |
|                               | 819                       | 1364  | 798                           | 803                          | 936                        | 1425  | 906                           | 923                          |
| Mittel-<br>wert               | 819                       | 1360  | 797                           | 802                          | 933                        | 1421  | 907                           | 920                          |

$\Delta\epsilon$  pro Skalenteil: 0,0090

0,010

<sup>1</sup>) E. Fischer, B. 39, 390 (1906); B. 38, 605 (1905), s. a. E. Abderhalden, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Abtlg. I, Teil 7, S. 831.

Tabelle 39.

| Flüssig-<br>keit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |                                |                                 | Flüssigkeitskondensator II |       |                                |                                 |
|-------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | Gl.<br>$c = 2,5 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 1,25 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | Gl.<br>$c = 2,5 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 1,25 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon :$               | 80,50                     | 75,62 | 80,50                          | 80,41                           | 80,50                      | 75,62 | 80,54                          | 80,45                           |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 816                       | 1356  | 814                            | 827                             | 928                        | 1419  | 924                            | 938                             |
|                               | 813                       | 1355  | 818                            | 822                             | 930                        | 1422  | 921                            | 939                             |
|                               | 810                       | 1351  | 818                            | 826                             | 931                        | 1425  | 926                            | 934                             |
|                               | 818                       | 1358  | 813                            | 830                             | 933                        | 1418  | 927                            | 934                             |
|                               | 818                       | 1355  | 812                            | 825                             | 927                        | 1418  | 932                            | 929                             |
|                               | 814                       | 1356  | 816                            | 822                             | 931                        | 1419  | 926                            | 937                             |
| Mittel-<br>wert               | 815                       | 1355  | 815                            | 825                             | 930                        | 1420  | 926                            | 935                             |

$\Delta \varepsilon$  pro Skalenteil : 0,0090

0,00996

Tabelle 40.

| Flüssig-<br>keit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |                              |                                | Flüssigkeitskondensator II |       |                              |                                |
|-------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | Gl.<br>$c = 1 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 0,5 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | Gl.<br>$c = 1 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 0,5 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon :$               | 80,50                     | 75,62 | 80,42                        | 80,40                          | 80,50                      | 75,62 | 80,43                        | 80,36                          |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 822                       | 1366  | 836                          | 838                            | 940                        | 1430  | 950                          | 949                            |
|                               | 824                       | 1369  | 835                          | 840                            | 938                        | 1427  | 947                          | 947                            |
|                               | 827                       | 1365  | 829                          | 835                            | 938                        | 1427  | 940                          | 953                            |
|                               | 821                       | 1360  | 832                          | 830                            | 936                        | 1422  | 944                          | 956                            |
|                               | 820                       | 1364  | 828                          | 832                            | 935                        | 1428  | 948                          | 955                            |
|                               | 826                       | 1364  | 833                          | 831                            | 941                        | 1426  | 942                          | 951                            |
| Mittel-<br>wert               | 823                       | 1365  | 832                          | 834                            | 938                        | 1427  | 945                          | 952                            |

$\Delta \varepsilon$  pro Skalenteil : 0,0090

0,00998

Tabelle 41.

| Flüssig-<br>keit:             | Flüssigkeitskondensator I |       |                                 |                                  | Flüssigkeitskondensator II |       |                                 |                                  |
|-------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------|
|                               | H <sub>2</sub> O          | E III | Gl.<br>$c = 0,25 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 0,125 \cdot 10^{-3}$ | H <sub>2</sub> O           | E III | Gl.<br>$c = 0,25 \cdot 10^{-3}$ | Gl.<br>$c = 0,125 \cdot 10^{-3}$ |
| $\varepsilon$ :               | 80,50                     | 75,62 | 80,32                           | 80,47                            | 80,50                      | 75,62 | 80,38                           | 80,45                            |
| Konden-<br>sator-<br>stellung | 832                       | 1373  | 853                             | 829                              | 946                        | 1434  | 955                             | 956                              |
|                               | 831                       | 1370  | 850                             | 827                              | 944                        | 1435  | 956                             | 951                              |
|                               | 826                       | 1368  | 845                             | 832                              | 941                        | 1431  | 960                             | 946                              |
|                               | 828                       | 1373  | 848                             | 832                              | 944                        | 1427  | 959                             | 946                              |
|                               | 825                       | 1370  | 851                             | 834                              | 945                        | 1434  | 955                             | 950                              |
|                               | 830                       | 1370  | 846                             | 830                              | 949                        | 1430  | 958                             | 952                              |
| Mittel-<br>wert               | 829                       | 1371  | 849                             | 831                              | 945                        | 1432  | 957                             | 950                              |

$\Delta\varepsilon$  pro Skalenteil: 0,0090

0,010

Tabelle 42.

Zusammenstellung der gemessenen  $\varepsilon$ -Werte.

| Gl.<br>$c \cdot 10^{-3}$ | 0,125 | 0,25  | 0,5   | 1      | 1,25  | 2,5   | 5     | 10    |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| $\varepsilon$            | 80,47 | 80,32 | 80,40 | 80,42  | 80,41 | 80,50 | 80,65 | 80,72 |
|                          |       |       |       |        |       |       |       | 80,76 |
|                          | 80,45 | 80,38 | 80,36 | 80,43  | 80,45 | 80,54 | 80,63 | 80,77 |
| Mittelwert               | 80,46 | 80,35 | 80,38 | 80,425 | 80,43 | 80,52 | 80,64 | 80,74 |

Fig. 10.

$\varepsilon$ -c-Kurve des Glycylglycins.




Tabelle 43.  
Zusammenstellung der Hauptergebnisse.

| c . 10 <sup>-3</sup> | $\epsilon$ -Werte für |                              |                              |                                            |                                         |                   |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                      | Methyl-<br>orange     | p-Amino-<br>benzoe-<br>säure | o-Amino-<br>benzoe-<br>säure | $\alpha$ -Amino-<br>iso-valeri-<br>ansäure | $\delta$ Amino-n<br>-valerian-<br>säure | Glycyl-<br>glycin |
| 0,1                  |                       | 80,45                        | 80,43                        |                                            |                                         |                   |
| 0,125                | 80,47                 |                              |                              | 80,45                                      | 80,49                                   | 80,46             |
| 0,25                 | 80,41                 |                              |                              | 80,33                                      | 80,48                                   | 80,35             |
| 0,5                  | 80,19                 | 80,33                        | 80,32                        | 80,24                                      | 80,45                                   | 80,38             |
| 1                    | 79,94                 | 80,21                        | 80,27                        | 80,39                                      | 80,40                                   | 80,42             |
| 1,25                 |                       | 80,20                        | 80,24                        | 80,43                                      | 80,39                                   | 80,43             |
| 2                    | 79,78                 |                              |                              |                                            |                                         |                   |
| 2,5                  |                       | 80,15                        | 80,19                        | 80,49                                      | 80,58                                   | 80,52             |
| 5                    |                       | 80,08                        | 80,13                        | 80,51                                      | 80,72                                   | 80,64             |
| 10                   |                       | 79,98                        | 80,07                        | 80,54                                      | 80,80                                   | 80,74             |

## IV. Besprechung der Messresultate.

Aus der  $\epsilon$ -c-Kurve für Methylorange (Fig. 4) ist ersichtlich, daß mit steigendem c eine Abnahme von  $\epsilon$  verbunden ist. Zunächst ist Proportionalität zwischen  $\epsilon$  und c vorhanden. Im letzten Stück der Kurve erfolgt dann eine Verlangsamung des Abfalls von  $\epsilon$ . Wie Tabelle 9 zeigt, stehen meine Meßergebnisse im vollständigen Gegensatz zu den von Blüh gefundenen  $\epsilon$ -Werten, die für sämtliche untersuchten Konzentrationen beträchtlich über dem Wasserwert liegen. Dagegen steht der Charakter meiner Methylorange-Kurve in Uebereinstimmung mit dem Kurventyp, den Walden, Ulich und Werner<sup>1</sup> an wässerigen Salzlösungen erhalten haben. Auch sie erhalten mit steigender Salzkonzentration eine Abnahme der DK. Als allgemeine Gestalt der  $\epsilon$ -c-Kurven haben sie gefunden, daß sie sich aus einem absteigenden und einem aufsteigenden Ast, der häufig über die DK des Lösungsmittels hinausführt, zusammensetzen. Der aufsteigende Kurventeil konnte bei wässerigen Lösungen noch nicht nachgewiesen werden, wohl aber in Medien

1) Z. f. phys. Ch. 116, 261 (1925).

niederer DK. Die Abweichungen zwischen den von Bl ü h und den von mir gefundenen Werten führe ich darauf zurück, daß die von Bl ü h verwandte D r u d e s c h e Apparatur für Messungen nur sehr kleiner DK-Änderungen nicht empfindlich genug ist. Aus meinen Messungen geht deutlich hervor, daß das dielektrische Verhalten von Methylorange in wässriger Lösung seiner Salznatur entspricht. Da in der Lösung keine Zwitterionen enthalten sind, ist auch gar kein anderes Verhalten von Methylorange zu erwarten. Auf die von Bl ü h aus seinen Messungen gezogenen Folgerungen brauche ich nicht näher einzugehen, da sie schon von Thiel<sup>1</sup> widerlegt worden sind. Daß sich ein geringer Zwitterionengehalt noch garnicht in der DK auswirkt, ergab die DK-Messung einer bei 20° gesättigten Lösung von Helianthin in Leitfähigkeitswasser ( $c=12,37 \cdot 10^{-5}$ , Zwitterionengehalt 15,7  $\frac{\circ}{10}$ ), die keinen Unterschied gegenüber dem Wasserwert zeigte. Eine Reihe von Versuchen habe ich noch mit Helianthin-Lösungen verschiedenen Zwitterionengehaltes ausgeführt. Diese Messungen in Lösungen bekannter  $[H^+]$  hatten nur orientierenden Wert. In  $\frac{n}{10}$  HCl (Stufe 1,07) ist Helianthin vollständig als Zwitterion enthalten. Infolge der hohen Leitfähigkeit dieser Lösung tritt eine starke Dämpfung auf, und der Resonanzpunkt kann nur ganz grob bestimmt werden. Die Messung der  $\frac{n}{10}$  HCl ergab eine große Erniedrigung der DK gegenüber Wasser ( $\epsilon < 70$ ). Ein Unterschied zwischen der DK der  $\frac{n}{10}$  HCl ohne und mit Helianthin konnte nicht festgestellt werden. Dasselbe Resultat wurde bei  $\frac{n}{100}$  Essigsäure ohne und mit Helianthin (51% Zwitterionengehalt) erhalten. Zu demselben Ergebnis führte auch die Messung der  $\frac{n}{10}$  Essigsäure ohne und mit Helianthin (75% Zwitterionengehalt).

Eine Nachprüfung der Bl ü h'schen Messungen an o- und p-Aminobenzoesäure führte ebenfalls zu gänzlich abweichenden Werten. Während Bl ü h wieder für sämtliche Konzentrationen Erhöhungen der DK über den Wasserwert findet, ergaben meine Messungen mit steigendem c eine

1) A. Thiel, Z. f. phys. Ch. 113, 53 (1924).

Abnahme von  $\epsilon$ . Es findet zunächst ein proportionaler Abfall von  $\epsilon$  statt und dann eine langsamere Abnahme. Die Kurve für die o-Aminobenzoessäure verläuft etwas flacher als die der p-Aminobenzoessäure.

Ein anderes Bild zeigen die Kurven für die  $\alpha$ -Amino-iso-valeriansäure,  $\delta$ -Amino-n-valeriansäure und das Glycylglycin. Nach anfänglichem proportionalem Abfall von  $\epsilon$  mit steigendem  $c$  erfolgt ein Anstieg der DK bis über den Wasserwert hinaus. Während die Kurve für die  $\alpha$ -Amino-iso-valeriansäure sich nur sehr wenig über den Wasserwert erhebt, liegen die entsprechenden Werte für die beiden andern Aminosäuren etwas höher. Die Erhöhungen der DK sind nur sehr gering. Man hatte eigentlich größere Effekte erwartet. — Was kann man nun aus den vorliegenden Messungen an den Aminosäuren hinsichtlich des Dipolmomentes der Zwitterionen schließen? Um diese Frage beantworten zu können, sind einige theoretische Betrachtungen notwendig.

## V. Theoretische Folgerungen.

Bekanntlich versteht man unter der DK eines Stoffes das Verhältnis der beiden Kapazitäten eines Kondensators, wenn sich zwischen den Kondensatorplatten einmal das Dielektrikum befindet, das andere Mal der Zwischenraum luftleer ist. Die verschiedenen DK der Dielektrika sind darauf zurückzuführen, daß durch das zwischen den beiden Kondensatorplatten herrschende Feld eine von Stoff zu Stoff variable dielektrische Polarisation eintritt. Man versteht hierunter die Ausbildung eines positiven und eines negativen Poles an jeder Molekel bzw. jedem Atom des Dielektrikums durch die Wirkung der Feldkräfte. Elektronen und Kernsystem rücken gegenüber ihrer normalen stabilen Anordnung etwas auseinander. Die dielektrische Polarisierbarkeit eines Stoffes ist nun eine Funktion von  $\epsilon$ . Sie beträgt nach Clausius-Mosotti pro Masseneinheit  $\frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \cdot \frac{1}{d}$ . Diese Formel für die Polarisation pro Masseneinheit ist für eine

Reihe von Stoffen gültig. Bei zahlreichen Stoffen ist sie nicht erfüllt. Diese Ausnahmen von der Regel führten Debye zu der Annahme, daß die Polarisierung nicht allein von der Verschiebung der Elektronen herrührt, sondern daß noch eine Orientierungspolarisation hinzukommt, die von starren, von vornherein in den Stoffen vorhandenen elektrischen Dipolen stammt. Unter dieser Annahme ist die Temperaturabhängigkeit der DK verständlich. Das Richtbestreben des elektrischen Feldes wird durch die Wärmebewegung gestört und zwar um so mehr, je höher die Temperatur ist. Die Orientierungspolarisation ist nun außer von der Temperatur noch abhängig von der Zahl und dem Moment der Dipole. Wir erhalten also für die Polarisierung einen zweigliedrigen Ausdruck, der sich zusammensetzt aus dem Anteil, der von den Verschiebungselektronen herrührt und praktisch unabhängig ist von der Temperatur, und dem Anteil, der auf die Richtung der Dipole zurückzuführen ist und von der Zahl und dem Moment der Dipole und der Temperatur abhängig ist. Für die Molekularpolarisation ergibt sich hiernach folgender Ausdruck


$$P = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \cdot \frac{M}{d} = \frac{4}{3} \pi N_L (\gamma' + \frac{\mu^2}{3 k T})^1 \quad (I)$$

( $N_L$  = Loschmidt'sche Zahl =  $0,606 \cdot 10^{24}$ ,  $\gamma'$  = Elektronenpolarisation einer Molekel,  $\mu$  = elektrisches Moment,  $k = 1,37 \cdot 10^{-16}$  [Boltzmann'sche Konstante],  $T$  = abs. Temp.)

Auch diese Formel ist nicht allgemein gültig. Debye führt die Unstimmigkeiten auf Assoziationen zurück. Treten nämlich Assoziationen auf, so bilden sich durch Zusammenlagerung Komplexe, deren Moment größer oder kleiner als das der einzelnen Molekel sein kann. Ist die Molekel senkrecht zur Richtung der Polachsen gestreckt, so ist die Bildung von Kettenassoziation (Fig. 11, a) sehr wahrscheinlich. Das resultierende Moment ist größer als das der Einzelmolekel. Ist die Molekel in Richtung der Polachsen gestreckt, so wird der Assoziationsstyp b dem von c bevorzugt sein. Das Dipolmoment wird also  $\sim 0$ . Der Assoziationsgrad ist nun wieder abhängig von der Temperatur und zwar sinkt er mit steigender Temperatur.

1) P. Debye, Handbuch der Radiologie, Bd. VI S. 597 (1924).

Fig. 11



Ein Zahlenbeispiel möge noch die erhebliche Assoziation von Flüssigkeiten erläutern. Die Orientierungspolarisation für Wasserdampf bei  $20^{\circ}$  beträgt  $\sim 71$ , für Wasser (flüssig) 8,05. Die Anzahl der Dipole hat sich also durch die Kondensation auf  $\sim 1/9$  vermindert, was nur durch Assoziation erklärlich ist.

Die Molekularpolarisation  $P$  haben wir oben zerlegt in den Anteil, der von den Verschiebungselektronen ( $P_E$ ) und in den, der von dem Richteffekt der Dipole ( $P_O$ ) herrührt. L. Ebert<sup>1</sup> hat nun gezeigt, daß man auch noch den Anteil, der auf die Verschiebung schwerer, als Ganzes geladener Komplexe, seien dies nun Kerne, Ionen oder Radikale, zu berücksichtigen hat. Dieser Anteil möge  $P_A$  heißen. Für die Molekularpolarisation  $P$  erhalten wir dann folgenden Ausdruck  $P = P_E + P_A + P_O$ . Daß die Einführung von  $P_A$  berechtigt ist, erläutern am besten einige Beispiele. Die Molekularpolarisation von Eis beträgt 9,5, der Anteil  $P_E = 3,7$ . Die Orientierungspolarisation von Eis können wir praktisch gleich 0 setzen, da die Dipole hier festgelegt sind. Die Differenz  $P - P_E = P_A = 5,8$  haben wir also den schweren Verschiebungsanteilen zuzuschreiben. Für Rohrzucker mit den Werten für  $P_{\text{fest}} = 93,8$  und  $P_E = 69$  ergibt sich ein noch größerer Wert von  $P_A$ , nämlich 24,8.

Was kann man nun über die Polarisation in Mischungen aussagen? Welche Schlüsse kann man aus den DK-Messungen der Zwitterionen enthaltenden Aminosäurelösungen hinsichtlich des Dipolmomentes der Zwitterionen ziehen? So

1) L. Ebert, Z. f. phys. Ch. 113, 1 (1924).

einfach, wie Blüh die Sachlage ansieht, daß ein Gehalt an Zwitterionen die DK des Lösungsmittels erhöhen müßte, liegen die Verhältnisse nicht. Ein erfolgreicher Ansatz zur Deutung der dielektrischen Polarisation wässriger Lösungen liegt von L. Ebert<sup>1</sup> vor. Kennt man die DK einer Lösung, so kann man die „spezifische Polarisation“  $P_L = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2}$ , die sich also auf 1 cm<sup>3</sup> bezieht, berechnen. Diese „spezifische Polarisation“ der Lösung setzt sich nun folgendermaßen aus der Molekularpolarisation des gelösten Stoffes und der „spez. Pol.“ des Wassers zusammen. Sind  $n_A$  Mole des gelösten Stoffes A in 1 cm<sup>3</sup> enthalten, so beträgt der Anteil von A an  $P_L$ , der „spez. Pol.“ der Lösung,  $n_A \cdot P$  oder — unter Einsetzung der verschiedenen Anteile von  $P$  —  $n_A (P_E + P_A + P_O)$ . Für die in 1 cm<sup>3</sup> der Lösung vorhandenen  $w$  cm<sup>3</sup> Wasser in reinem Zustande ist die „spez. Pol.“  $w \cdot P^0 = w (P^0_E + P^0_A + P^0_O)$ . Der Ausdruck für  $P_L$  lautet also

$$P_L = n_A (P_E + P_A + P_O) + w (P^0_E + P^0_A + P^0_O). \quad (II)$$

Die einzelnen Anteile für das Lösungswasser  $P^0_E$ ,  $P^0_A$  und  $P^0_O$  werden nun durch die Auflösung eines Fremdstoffes eine Aenderung erfahren gegenüber den Anteilen, die sich auf Wasser ohne einen darin gelösten Stoff beziehen: es gelten nunmehr die Werte  $P'_E$ ,  $P'_A$ ,  $P'_O$ . In erster Annäherung kann man die Annahme<sup>2</sup> machen, daß die Aenderungen von  $P^0_E$  und  $P^0_A$  klein sind im Verhältnis zu der von  $P^0_O$ .  $P^0_O$  wird eine Verminderung erfahren, da Dipole des Wassers durch die Ionenkraftfelder gerichtet werden und dadurch dem Richteffekt des äußeren Feldes entgegen. Vernachlässigt man also die Aenderungen von  $P^0_E$  und  $P^0_A$ , so kann man die Beziehung aufstellen  $(P^0_E + P^0_A + P^0_O) - (P'_E + P'_A + P'_O) = P^0_O - P'_O = \Delta P_O$ . Für  $P_L$  erhält man dann

$$P_L = n_A (P_E + P_A + P_O) + w (P^0_E + P^0_A + P^0_O) - w \Delta P_O \quad (III)$$

oder nach  $P_O$  aufgelöst

$$P_O = \frac{P_L}{w} - (P^0_E + P^0_A + P^0_O) - \frac{n_A}{w} (P_E + P_A) + \Delta P_O \quad (IV)$$

1) L. Ebert, Z. f. phys. Ch. 122, 28 (1926).

2) ibid. S. 30.

Setzt man in dieser Gleichung  $\Delta P_O = 0$ , so kann man einen Mindestwert für  $P_O$  errechnen.  $P_L$  erhält man aus dem  $\varepsilon$ -Wert der Lösung ( $P_L = \frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2} (P_{0E} + P_{0A} + P_{0O}) = P_{H_2O}$ ) ist ebenfalls aus  $\varepsilon$  berechenbar ( $P_{H_2O} = \frac{80,50-1}{80,50+2} = 0,96365$ ),  $P_E$  läßt sich aus der Molekularrefraktion bestimmen und  $P_A$  aus Refraktionsmessungen im langwelligen Ultrarot oder schätzungsweise aus der Beziehung  $P_{\text{fest}} - P_{E \text{ flüssig}} \cong P_{A \text{ fest}}$ .

Sehr lehrreich sind nun einige Berechnungen von  $P_O$ , die Ebert durchgeführt hat. Rohrzuckerlösungen ergeben Erniedrigungen der DK mit steigendem  $c$ . Berechnet man nun z. B. für die 10%ige Lösung<sup>1</sup> nach Formel (IV)  $P_O$ , so erhält man einen Mindestwert von 110, also einen ziemlich beträchtlichen Wert, der aber für die komplizierte Rohrzuckermolekel durchaus verständlich ist. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, daß man aus der Erniedrigung der DK des Wassers durch einen gelösten Stoff nicht auf eine geringe Orientierungspolarisation und damit ein kleines Dipolmoment schließen kann. Umgekehrt kann man aus der Erhöhung der DK des Wassers bei Zusatz eines Stoffes nicht ohne weiteres etwas über das Dipolmoment des Stoffes aussagen. Harnstofflösungen ergeben z. B. starke Erhöhungen der DK. Errechnet man nun z. B. für die 3,84%ige Lösung<sup>2</sup> mit einer DK von 83,1 nach obiger Formel  $P_O$ , so resultiert ein Mindestwert von 26, also nur ein kleiner Wert. Ein weiteres von Ebert<sup>3</sup> durchgerechnetes Beispiel ist die Sulfanilsäure, für die Blüh<sup>4</sup> auch Erhöhungen der DK gefunden hat. Für die 0,11%ige Lösung mit der DK 89,9 bei 20° kommt Ebert zu einem Wert von 2500 für  $P_O$ . Unter Berücksichtigung der partiellen Hydrolyse des Zwitterions kommt — unter Vernachlässigung der Ionen mit einer Ladung — für  $P_O$  ein noch etwas höherer Betrag ( $\sim 3400$ ) heraus.

1) L. Kockel, Ann. d. Phys. 77, 417 (1925).

2) R. Fürth, Ann. d. Phys. 70, 69 (1923).

3) L. Ebert, Z. f. phys. Ch. 122, 37 (1926).

4) loc. cit.

Aus  $P_O$  kann man das Dipolmoment  $\mu$  auf Grund der oben angegebenen Beziehung  $P_O = \frac{4}{3} \pi N_L \cdot \frac{\mu^2}{3 k T}$  berechnen.  $P_O = 3400$  entspricht ein Moment von  $\sim 11 \cdot 10^{-18}$ , eine Größenordnung, die man erwartet hatte. Leider ist nun Ebert ein Rechenfehler untergelaufen, auf den das günstige Resultat zurückzuführen ist. Die „spez. Pol.“  $P_L$  beträgt nämlich für die 0,11%ige Sulfanilsäurelösung mit der DK 89,9 0,96734 und nicht 0,9785, wie Ebert berechnet hat. Für  $P_O$  ergibt sich dann ein Wert von 430. Berücksichtigt man nur den Zwitterionengehalt, so beträgt  $P_O \sim 660$ , was einem Dipolmoment von  $5,6 \cdot 10^{-18}$  entspricht. Das so erhaltene Moment ist immer noch größer, als man es sonst im allgemeinen findet. Da ich bei meinen Messungen an den Amidobenzoesäuren und an Methylorange von den der Blüh'schen Messungen so abweichende Resultate erhalten habe, zweifle ich auch an der Richtigkeit der DK-Werte für die Sulfanilsäure. Wenn diese DK-Werte zu hoch sind, so macht sich das sehr stark bemerkbar für den Wert  $P_O$  und damit das Dipolmoment. Die Messungen an Sulfanilsäure konnte ich leider nicht kontrollieren, da schon die verdünnten Lösungen so außerordentlich gut leiten, daß eine genaue DK-Bestimmung nicht möglich ist.<sup>1</sup>

Berechnet man nun aus den von mir gewonnenen Meßresultaten die Orientierungspolarisation  $P_O$ , so ergeben sich für sämtliche Aminosäuren Werte, die  $< 1$  sind. Daraus darf man nun aber nicht schließen, daß die Zwitterionen so gut wie gar kein Dipolmoment besitzen; denn die Formel (IV) stellt ja nur eine Näherungsformel dar, die nur einen Mindestwert liefert. Die in der Lösung erfolgenden Assoziationen berücksichtigt sie zudem nicht. Dazu sind die Verhältnisse auch viel zu verwickelt. Die Zwitterionen werden sich jedenfalls zusammenlagern können. Die Komplexe können das

1) Inzwischen ist eine Arbeit von P. Walden und O. Werner erschienen (Z. f. phys. Ch. 129, 405 [1927]), die einige Messungen an Sulfanilsäure enthält. Im Gegensatz zu den Messungen von Blüh sind auch hier statt Erhöhungen durchweg Erniedrigungen der DK festgestellt worden. Auf Grund dieser Ergebnisse ist nun auch die von Ebert durchgeführte und von mir korrigierte Berechnung des Dipolmomentes der Sulfanilsäure auf Grund der Blüh'schen Messungen überholt.

Moment 0 haben oder ein größeres Moment als das einzelne Zwitterion. Ferner können die Zwitterionen von den Dipolen des Wassers eingehüllt sein und nach außen unwirksam geworden sein. Gleichzeitig wird auch noch  $P^0_0$  des Wassers geändert. In welchem Maße das geschieht, kann man aber nicht sagen.

Die  $\epsilon$ -c-Kurven der Aminosäuren kann man deshalb nur ganz allgemein erklären. Der absteigende Ast, die Abnahme von  $\epsilon$  mit steigendem c, läßt sich auf die Verminderung von  $P^0_0$  des Wassers zurückführen. Bei größeren Konzentrationen können sich dann durch Assoziation Komplexe bilden, die einen Beitrag  $P_0$  liefern. Die DK steigt deshalb an. Bei den Aminobenzoesäuren erhält man nur einen absteigenden Kurventeil zum Unterschied von den Aminosäuren der Fettreihe. Dies läßt sich zwanglos darauf zurückführen, daß in den Lösungen der Aminobenzoesäuren nur verhältnismäßig wenig Zwitterionen vorhanden sind, während die übrigen Aminosäuren vorherrschend Zwitterionen enthalten, und deshalb die Möglichkeit zur Bildung von Komplexen mit einem Anteil  $P_0$  leichter gegeben ist.

Aus dem dielektrischen Verhalten der Aminosäuren geht hervor, daß es noch nicht möglich ist, irgend etwas Bestimmtes über das Dipolmoment der Zwitterionen auszusagen. Wahrscheinlich ist aber das Dipolmoment kleiner, als man es erwartet hatte. Um für  $\mu$  eine Größenordnung von  $\sim 12 \cdot 10^{-18}$  zu erhalten, hätte man für die aliphatischen Aminosäuren bei den Konzentrationen  $c = 1 \cdot 10^{-4}$  bzw.  $1 \cdot 10^{-3}$  bzw.  $1 \cdot 10^{-2}$  eine DK von  $\sim 81$  bzw.  $\sim 89$  bzw.  $\sim 500$  feststellen müssen. Solche nach einer Ueberschlagsrechnung berechneten DK-Werte habe ich bei den betr. Konzentrationen nicht gefunden. Meine Resultate lassen infolge der Mannigfaltigkeit der Assoziationen noch keine genaue Auswertung zu.

## VI. Zusammenfassung.

1. Mittels ungedämpfter elektrischer Wellen ( $\lambda = 5$  m), die von einem Röhrensender erzeugt wurden, wurde eine Resonanzmethode ausgearbeitet, welche die DK von Flüssigkeiten mit einer spezifischen Leitfähigkeit bis zu  $\kappa = 10^{-4}$  Ohm $^{-1}$  cm $^{-1}$  mit einer Genauigkeit von 1 bis 2‰ gestattet.
2. Die angegebene Leitfähigkeitsgrenze ist bedingt durch das Auftreten starker Dämpfung, die eine Verflachung der Resonanzkurve und demzufolge eine Verringerung der Meßgenauigkeit verursacht.
3. Es wurde bei Methylorange, Helianthin und verschiedenen aromatischen und aliphatischen Aminokarbonsäuren die Abhängigkeit der DK wässriger Lösungen von der Konzentration gemessen.
4. Die Ergebnisse der Untersuchung von Methylorange und Helianthin beweisen die Unhaltbarkeit der Ansichten von Blüh.
5. Die aromatischen Aminosäuren geben nur Erniedrigungen der DK, dagegen besteht bei den aliphatischen Aminosäuren die  $\epsilon$ -c-Kurve aus einem absteigenden Anfangsteil und anschließendem Anstieg über den Wasserwert.
6. Es wurde eine theoretische Deutung der Ergebnisse versucht; Solvatbildung und Assoziation erschweren vorläufig einen sicheren Einblick in Eigenschaften und Verhalten der Zwitterionen.

---

Die vorstehenden Untersuchungen wurden vom Sommer-Semester 1924 bis Mitte Sommer-Semester 1927 im Physikalisch-chemischen Institut der Universität Marburg ausgeführt. Herrn Prof. Dr. A. Thiel, unter dessen Leitung die Arbeit entstand, bin ich für seine stets bereite Unterstützung und Hilfsbereitschaft, die er mir in jeder Hinsicht erwies, zu aufrichtigem Dank verpflichtet.

Für wertvolle Ratschläge danke ich den Herren Dr. E. Baars und Dr. L. Bergmann.

## Lebenslauf.



Am 2. Juni 1901 wurde ich, Erwin Horn, als Sohn des Rektors August Horn und seiner Ehefrau Marie, geb. Meyer, in Harburg (Elbe) geboren. Ich bin evangelischen Bekenntnisses und besitze die preußische Staatsangehörigkeit. Von Ostern 1907 bis Ostern 1910 besuchte ich die Mittelschule meiner Heimatstadt. Dann trat ich in die Sexta des Realgymnasiums ein, welches ich Ostern 1920 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Im S.-S. 1920 begann ich mit dem Studium der Chemie an der Universität Hamburg. Das W.-S. 1920/21 verbrachte ich in Greifswald. Vom S.-S. 1921 ab studierte ich in Marburg. Das erste Verbandsexamen bestand ich am 20. Juli 1922, das zweite Verbandsexamen am 3. August 1923 und das Ergänzungsexamen in physikalischer Chemie am 26. Januar 1924. Seit dem S.-S. 1924 arbeitete ich im Physikalisch-chemischen Institut an meiner Doktorarbeit, die ich Mitte S.-S. 1927 abschloß.

Meine akademischen Lehrer waren

in Hamburg: Koch, Nielsen, Rabe,

in Greifswald: Meisenheimer, Seeliger, Sieverts,

in Marburg: v. Auwers, Claussen, Krollpfeiffer, Nordhausen,  
Reißert, Schaefer, Senftleben, Strecker, Stuchtey,  
Take †, Thiel.

Ihnen allen bin ich für meine Ausbildung zu großem Dank verpflichtet.



